

# emt ridha kalkulus

NAMA: ARIFAH RIDHANINGTYAS  
NIM: 24030130090

## Kalkulus dengan EMT

Materi Kalkulus mencakup di antaranya:

- Fungsi (fungsi aljabar, trigonometri, eksponensial, logaritma, komposisi fungsi)
- Limit Fungsi,
- Turunan Fungsi,
- Integral Tak Tentu,
- Integral Tentu dan Aplikasinya,
- Barisan dan Deret (kekonvergenan barisan dan deret).

EMT (bersama Maxima) dapat digunakan untuk melakukan semua perhitungan di dalam kalkulus, baik secara numerik maupun analitik (eksak).

## Mendefinisikan Fungsi

Terdapat beberapa cara mendefinisikan fungsi pada EMT, yakni:

- Menggunakan format nama\_fungsi := rumus fungsi (untuk fungsi numerik),
- Menggunakan format nama\_fungsi &= rumus fungsi (untuk fungsi simbolik, namun dapat dihitung secara numerik),
- Menggunakan format nama\_fungsi &&= rumus fungsi (untuk fungsi simbolik murni, tidak dapat dihitung langsung),
- Fungsi sebagai program EMT.

Setiap format harus diawali dengan perintah function (bukan sebagai ekspresi).

Berikut adalah beberapa contoh cara mendefinisikan fungsi:

$$f(x) = 2x^2 + e^{\sin(x)}.$$

```
>function f(x) := 2*x^2+exp(sin(x)) // fungsi numerik
>f(0), f(1), f(pi)
```

```
1
4.31977682472
20.7392088022
```

```
>f(a) // tidak dapat dihitung nilainya
```

```
Variable or function a not found.
Error in:
f(a) // tidak dapat dihitung nilainya ...
^
```

Silakan Anda plot kurva fungsi di atas!

Berikutnya kita definisikan fungsi:

$$g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3x}}{x + 1}.$$

```
>function g(x) := sqrt(x^2-3*x)/(x+1)
>g(3)
```

```
0
```

```
>g(0)
```

```
0
```

```
>g(1) // kompleks, tidak dapat dihitung oleh fungsi numerik
```

```
Floating point error!
Error in sqrt
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
g:
  useglobal; return sqrt(x^2-3*x)/(x+1)
Error in:
```

```
g(1) // kompleks, tidak dapat dihitung oleh fungsi numerik ...
^
```

Silakan Anda plot kurva fungsi di atas!

```
>f(g(5)) // komposisi fungsi
```

```
2.20920171961
```

```
>g(f(5))
```

```
0.950898070639
```

```
>function h(x) := f(g(x)) // definisi komposisi fungsi
>h(5) // sama dengan f(g(5))
```

```
2.20920171961
```

Silakan Anda plot kurva fungsi komposisi fungsi f dan g:

$$h(x) = f(g(x))$$

dan

$$u(x) = g(f(x))$$

bersama-sama kurva fungsi f dan g dalam satu bidang koordinat.

```
>f(0:10) // nilai-nilai f(0), f(1), f(2), ..., f(10)
```

```
[1, 4.31978, 10.4826, 19.1516, 32.4692, 50.3833, 72.7562,
99.929, 130.69, 163.51, 200.58]
```

```
>fmap(0:10) // sama dengan f(0:10), berlaku untuk semua fungsi
```

```
[1, 4.31978, 10.4826, 19.1516, 32.4692, 50.3833, 72.7562,
99.929, 130.69, 163.51, 200.58]
```

```
>gmap(200:210)
```

```
[0.987534, 0.987596, 0.987657, 0.987718, 0.987778, 0.987837,
0.987896, 0.987954, 0.988012, 0.988069, 0.988126]
```

Misalkan kita akan mendefinisikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & x > 0 \\ x^2 & x \leq 0. \end{cases}$$

Fungsi tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai fungsi numerik secara "inline" menggunakan format :=, melainkan didefinisikan sebagai program. Perhatikan, kata "map" digunakan agar fungsi dapat menerima vektor sebagai input, dan hasilnya berupa vektor. Jika tanpa kata "map" fungsinya hanya dapat menerima input satu nilai.

```
>function map f(x) ...
  if x>0 then return x^3
  else return x^2
endif;
endfunction
```

```
>f(1)
```

```
1
```

```
>f(-2)
```

```
4
```

```
>f(-5:5)
```

```
[25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 8, 27, 64, 125]
```

```
>aspect(1.5); plot2d("f(x)",-5,5):
>function f(x) &= 2*E^x // fungsi simbolik
```

$$2 E^x$$

```
>$f(a) // nilai fungsi secara simbolik
>f(E) // nilai fungsi berupa bilangan desimal
```

```
30.308524483
```

```
>$f(E), $float(%)
>function g(x) &= 3*x+1
```

$$3 x + 1$$

```
>function h(x) &= f(g(x)) // komposisi fungsi
```

$$2 E^{3 x + 1}$$

```
>plot2d("h(x)",-1,1):
```

## Latihan

Bukalah buku Kalkulus. Cari dan pilih beberapa (paling sedikit 5 fungsi berbeda tipe/bentuk/jenis) fungsi dari buku tersebut, kemudian definisikan fungsi-fungsi tersebut dan komposisinya di EMT pada baris-baris perintah berikut (jika perlu tambahkan lagi). Untuk setiap fungsi, hitung beberapa nilainya, baik untuk satu nilai maupun vektor. Gambar grafik fungsi-fungsi tersebut dan komposisi-komposisi 2 fungsi.

Juga, carilah fungsi beberapa (dua) variabel. Lakukan hal sama seperti di atas.

```
>function f(x) &= x^3 - 2*x^2 + x
```

$$x^3 - 2 x^2 + x$$

```
>function g(x) &= sin(x) + x/2
```

$$\sin(x) + \frac{x}{2}$$

```
>function h(x) &= exp(x) / (1 + exp(x))
```

$$\frac{E^x}{E^x + 1}$$

```
>function k(x) &= (x^2 + 1) / (x - 1)
```

$$\frac{x^2 + 1}{x - 1}$$

```
>function m(x) &= log(x) * cos(x)
```

$$\cos(x) \log(x)$$

```
>plot2d("m(x)", 0.1, 6):
```

## Menghitung Limit

Perhitungan limit pada EMT dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi Maxima, yakni "limit". Fungsi "limit" dapat digunakan untuk menghitung limit fungsi dalam bentuk ekspresi maupun fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nilai limit dapat dihitung pada sebarang nilai atau pada tak hingga (-inf, minf, dan inf). Limit kiri dan limit kanan juga dapat dihitung, dengan cara memberi opsi "plus" atau "minus". Hasil limit dapat berupa nilai, "und" (tak definisi), "ind" (tak tentu namun terbatas), "infinity" (kompleks tak hingga).

Perhatikan beberapa contoh berikut. Perhatikan cara menampilkan perhitungan secara lengkap, tidak hanya menampilkan hasilnya saja.

```
>$showev('limit(sqrt(x^2-3*x)/(x+1),x,inf))
>$limit((x^3-13*x^2+51*x-63)/(x^3-4*x^2-3*x+18),x,3)

maxima: 'limit((x^3-13*x^2+51*x-63)/(x^3-4*x^2-3*x+18),x,3)=limit((x^3-13*x^2+51*x-63)/(x^3-4*x^2-3*x+18
Fungsi tersebut diskontinu di titik x=3. Berikut adalah grafik fungsinya.

>aspect(1.5); plot2d("(x^3-13*x^2+51*x-63)/(x^3-4*x^2-3*x+18)",0,4); plot2d(3,-4/5,>points,style="ow",>add):
>$limit(2*x*sin(x)/(1-cos(x)),x,0)

maxima: 'limit(2*x*sin(x)/(1-cos(x)),x,0)=limit(2*x*sin(x)/(1-cos(x)),x,0)
Fungsi tersebut diskontinu di titik x=0. Berikut adalah grafik fungsinya.

>plot2d("2*x*sin(x)/(1-cos(x))",-pi,pi); plot2d(0,4,>points,style="ow",>add):
>$limit(cot(7*h)/cot(5*h),h,0)

maxima: showev('limit(cot(7*h)/cot(5*h),h,0))
Fungsi tersebut juga diskontinu (karena tidak terdefinisi) di x=0. Berikut adalah grafiknya.

>plot2d("cot(7*x)/cot(5*x)",-0.001,0.001); plot2d(0,5/7,>points,style="ow",>add):
>$showev('limit(((x/8)^(1/3)-1)/(x-8),x,8))

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

>$showev('limit(1/(2*x-1),x,0))

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

>$showev('limit((x^2-3*x-10)/(x-5),x,5))

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

>$showev('limit(sqrt(x^2+x)-x,x,inf))

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

>$showev('limit(abs(x-1)/(x-1),x,1,minus))

Hitung limit di atas untuk x menuju 1 dari kanan.
Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

>$showev('limit(sin(x)/x,x,0))
>plot2d("sin(x)/x",-pi,pi); plot2d(0,1,>points,style="ow",>add):
>$showev('limit(sin(x^3)/x,x,0))

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

>$showev('limit(log(x), x, minf))
>$showev('limit((-2)^x,x, inf))
>$showev('limit(t-sqrt(2-t),t,2,minus))
>$showev('limit(t-sqrt(2-t),t,2,plus))
>$showev('limit(t-sqrt(2-t),t,5,plus)) // Perhatikan hasilnya
>plot2d("x-sqrt(2-x)",0,2):
>$showev('limit((x^2-9)/(2*x^2-5*x-3),x,3))

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

>$showev('limit((1-cos(x))/x,x,0))

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

>$showev('limit((x^2+abs(x))/(x^2-abs(x)),x,0))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$showev('limit((1+1/x)^x,x,inf))
>plot2d("(1+1/x)^x",0,1000):
>$showev('limit((1+k/x)^x,x,inf))
>$showev('limit((1+x)^(1/x),x,0))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$showev('limit((x/(x+k))^x,x,inf))
>$showev('limit((E^x-E^2)/(x-2),x,2))
```

Tunjukkan limit tersebut dengan grafik, seperti contoh-contoh sebelumnya.

```
>$showev('limit(sin(1/x),x,0))
>$showev('limit(sin(1/x),x,inf))
>plot2d("sin(1/x)",-0.001,0.001):
```

```
aspect(1.5);
aspect(1.5);
```

## Latihan

Bukalah buku Kalkulus. Cari dan pilih beberapa (paling sedikit 5 fungsi berbeda tipe/bentuk/jenis) fungsi dari buku tersebut, kemudian definisikan di EMT pada baris-baris perintah berikut (jika perlu tambahkan lagi). Untuk setiap fungsi, hitung nilai limit fungsi tersebut di beberapa nilai dan di tak hingga. Gambar grafik fungsi tersebut untuk mengkonfirmasi nilai-nilai limit tersebut.

```
>$showev('limit((x^3-13*x^2+51*x-63)/(x^3-4*x^2-3*x+18),x,3));
```

EMT menggunakan Maxima untuk limit.  
Bentuk umum: \$limit(expr, variabel, titik)  
Gunakan 'plus' atau 'minus' untuk limit kanan/kiri.  
1. Limit fungsi rasional

```
>plot2d("(x^3-13*x^2+51*x-63)/(x^3-4*x^2-3*x+18)",0,4);
```

2. Limit fungsi trigonometri diskontinu di x=0

```
>$showev('limit(2*x*sin(x)/(1-cos(x)),x,0))
>plot2d("2*x*sin(x)/(1-cos(x))",-pi,pi);
>plot2d(0,4,>points,style="ow",>add):
```

3. Limit cotangent (fungsi tidak terdefinisi di 0)

```
>$showev('limit(cot(7*h)/cot(5*h),h,0))
>plot2d("cot(7*x)/cot(5*x)",-0.001,0.001);
>plot2d(0,5/7,>points,style="ow",>add):
```

4. Limit akar pangkat pecahan

```
>$showev('limit(((x/8)^(1/3)-1)/(x-8),x,8))
>plot2d("((x/8)^(1/3)-1)/(x-8)",0,16);
>plot2d(8,0.026,>points,style="ow",>add):
```

5. Limit tak hingga

```
>$showev('limit(sqrt(x^2+x)-x,x,inf))
>plot2d("sqrt(x^2+x)-x",0,1000):
>plot2d(3,-4/5,>points,style="ow",>add):
```

## Turunan Fungsi

Definisi turunan:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Berikut adalah contoh-contoh menentukan turunan fungsi dengan menggunakan definisi turunan (limit).

```
>$showev('limit(((x+h)^2-x^2)/h,h,0)) // turunan x^2
>p &= expand((x+h)^2-x^2)|simplify; $p //pembilang dijabarkan dan disederhanakan
>q &=ratsimp(p/h); $q // ekspresi yang akan dihitung limitnya disederhanakan
```

```
>$limit(q,h,0) // nilai limit sebagai turunan
>$showev('limit(((x+h)^n-x^n)/h,h,0)) // turunan x^n
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

Sebagai petunjuk, ekspansikan  $(x+h)^n$  dengan menggunakan teorema binomial.

Berikut paragraf penjelasannya dalam bentuk narasi:

JAWAB

Hasil limit tersebut benar karena dapat dibuktikan menggunakan teorema binomial. Berdasarkan teorema binomial, ekspansi dari  $((x + h)^n)$  adalah  $(x^n + n x^{n-1}h + \binom{n}{2}x^{n-2}h^2 + \dots + h^n)$ . Jika kita kurangkan  $(x^n)$  dan kemudian membagi hasilnya dengan  $(h)$ , maka diperoleh  $(\frac{(x + h)^n - x^n}{h} = n x^{n-1} + \binom{n}{2}x^{n-2}h + \dots + h^{n-1})$ . Saat  $(h)$  mendekati nol, semua suku yang mengandung  $(h)$  akan hilang (menuju nol), sehingga tersisa hanya  $(n x^{n-1})$ . Dengan demikian, limit tersebut bernilai  $(n x^{n-1})$ , yang berarti turunan fungsi  $(f(x) = x^n)$  adalah  $(f'(x) = n x^{n-1})$ . Hal ini menunjukkan bahwa hasil limit yang diperoleh memang benar dan sesuai dengan aturan turunan pangkat.

```
>$showev('limit((sin(x+h)-sin(x))/h,h,0)) // turunan sin(x)
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

Sebagai petunjuk, ekspansikan  $\sin(x+h)$  dengan menggunakan rumus jumlah dua sudut.

JAWAB

Hasil limit tersebut benar karena dapat dibuktikan dengan menggunakan rumus jumlah sudut pada fungsi trigonometri. Berdasarkan rumus jumlah sudut,  $(\sin(x + h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h)$ . Jika substitusi rumus tersebut ke dalam limit  $(\frac{\sin(x + h) - \sin x}{h})$ , kita peroleh  $(\frac{\sin x (\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h})$ . Limit ini dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu  $(\sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h})$  dan  $(\cos x \cdot \frac{\sin h}{h})$ . Saat  $(h)$  mendekati nol, diketahui bahwa  $(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1)$  dan  $(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0)$ . Dengan demikian, hasil akhirnya adalah  $(0 \cdot \sin x + 1 \cdot \cos x = \cos x)$ . Jadi, benar bahwa turunan dari fungsi  $(\sin(x))$  adalah  $(\cos(x))$ .

```
>$showev('limit((log(x+h)-log(x))/h,h,0)) // turunan log(x)
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

Sebagai petunjuk, gunakan sifat-sifat logaritma dan hasil limit pada bagian sebelumnya di atas.

JAWAB

Hasil limit tersebut benar karena dapat dibuktikan menggunakan sifat logaritma. Berdasarkan sifat logaritma,  $(\log(a) - \log(b) = \log(\frac{a}{b}))$ . Dengan demikian, bentuk limitnya dapat ditulis sebagai  $(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x + h) - \log(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(\frac{x + h}{x})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(1 + \frac{h}{x})}{h}$ . Selanjutnya, misalkan  $(t = \frac{h}{x})$ , maka  $(h = x t)$  dan ketika  $(h \rightarrow 0)$ , maka  $(t \rightarrow 0)$ . Limit tersebut menjadi  $(\frac{1}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1 + t)}{t})$ . Diketahui dari hasil limit standar bahwa  $(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log(1 + t)}{t} = 1)$ . Maka hasil akhirnya adalah  $(\frac{1}{x})$ . Dengan demikian, turunan dari fungsi  $(\log(x))$  adalah  $(\frac{1}{x})$ , yang menunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar dan sesuai dengan aturan turunan logaritma.

```
>$showev('limit((1/(x+h)-1/x)/h,h,0)) // turunan 1/x
>$showev('limit((E^(x+h)-E^x)/h,h,0)) // turunan f(x)=e^x
```

Answering "Is x an integer?" with "integer"  
 Answering "Is x an integer?" with "integer"  
 Answering "Is x an integer?" with "integer"  
 Answering "Is x an integer?" with "integer"  
 Answering "Is x an integer?" with "integer"  
 Maxima is asking  
 Acceptable answers are: yes, y, Y, no, n, N, unknown, uk  
 Is x an integer?

Use assume!

Error in:

```
$showev('limit((E^(x+h)-E^x)/h,h,0)) // turunan f(x)=e^x ...
```

Maxima bermasalah dengan limit:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h}.$$

Oleh karena itu diperlukan trik khusus agar hasilnya benar.

```
>$showev('limit((E^h-1)/h,h,0))
>$showev('factor(E^(x+h)-E^x))
>$showev('limit(factor((E^(x+h)-E^x)/h),h,0)) // turunan f(x)=e^x
>function f(x) &= x^x
```

$$\frac{x}{x}$$

```
>$showev('limit(f(x),x,0))
```

Silakan Anda gambar kurva

$$y = x^x.$$

```
>$showev('limit((f(x+h)-f(x))/h,h,0)) // turunan f(x)=x^x
```

Di sini Maxima juga bermasalah terkait limit:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^{x+h} - x^x}{h}.$$

Dalam hal ini diperlukan asumsi nilai x.

```
>&assume(x>0); $showev('limit((f(x+h)-f(x))/h,h,0)) // turunan f(x)=x^x
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

JAWAB

Untuk menghitung turunan ( $x^x$ ) lebih rapi kita gunakan diferensiasi logaritmik. Ambil ( $y=x^x$ ) dan ambil logaritma natural: ( $\ln y = \ln(x^x) = x \ln x$ ). Diferensiasikan kedua ruas terhadap ( $x$ ): ( $\frac{1}{y} y' = \frac{d}{dx}(x \ln x) = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$ ). Mengalikan kedua sisi dengan ( $y$ ) (yaitu ( $x^x$ )) menghasilkan ( $y' = x^x(\ln x + 1)$ ). Jadi benar bahwa ( $\frac{d}{dx} x^x = x^x(\ln x + 1)$ ). Metode ini singkat karena mengubah pangkat yang bergantung pada ( $x$ ) menjadi bentuk yang mudah didiferensiasikan.

```
>&forget(x>0) // jangan lupa, lupakan asumsi untuk kembali ke semula
```

$$[x > 0]$$

```
>&forget(x<0)
```

$$[x < 0]$$

```
>&facts()
```

$$[]$$

```
>$showev('limit((asin(x+h)-asin(x))/h,h,0)) // turunan arcsin(x)
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

```
>$showev('limit((tan(x+h)-tan(x))/h,h,0)) // turunan tan(x)
```

Mengapa hasilnya seperti itu? Tuliskan atau tunjukkan bahwa hasil limit tersebut benar, sehingga benar turunan fungsinya benar. Tulis penjelasan Anda di komentar ini.

```
>function f(x) &= sinh(x) // definisikan f(x)=sinh(x)
```

$$\sinh(x)$$

```
>function df(x) &= limit((f(x+h)-f(x))/h,h,0); $df(x) // df(x) = f'(x)
```

Hasilnya adalah  $\cosh(x)$ , karena

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x).$$

```
>plot2d(["f(x)", "df(x)"], -pi, pi, color=[blue, red]):
>function f(x) &= sin(3*x^5+7)^2
```

$$\sin^2(3x^5 + 7)$$

```
>diff(f,3), diffc(f,3)
```

```
1198.32948904
1198.72863721
```

Apakah perbedaan diff dan diffc?

```
>$showev('diff(f(x),x)')
>% with x=3
>$float(%)
>plot2d(f,0,3.1):
>function f(x) &=5*cos(2*x)-2*x*sin(2*x) // mendefinisikan fungsi f
```

$$5 \cos(2x) - 2x \sin(2x)$$

```
>function df(x) &=diff(f(x),x) // fd(x) = f'(x)
```

$$-12 \sin(2x) - 4x \cos(2x)$$

```
>$f(1)=f(1), $float(f(1)), $f(2)=f(2), $float(f(2)) // nilai f(1) dan f(2)
>xp=solve("df(x)",1,2,0) // solusi f'(x)=0 pada interval [1, 2]
```

```
1.35822987384
```

```
>df(xp), f(xp) // cek bahwa f'(xp)=0 dan nilai ekstrim di titik tersebut
```

```
0
-5.67530133759
```

```
>plot2d(["f(x)", "df(x)"], 0, 2*pi, color=[blue, red]): //grafik fungsi dan turunannya
```

Perhatikan titik-titik "puncak" grafik  $y=f(x)$  dan nilai turunan pada saat grafik fungsinya mencapai titi

## Latihan

Bukalah buku Kalkulus. Cari dan pilih beberapa (paling sedikit 5 fungsi berbeda tipe/bentuk/jenis) fungsi kemudian definisikan di EMT pada baris-baris perintah berikut (jika perlu tambahkan lagi). Untuk setiap dengan menggunakan definisi turunan (limit), menggunakan perintah diff, dan secara manual (langkah demi Maxima) seperti contoh-contoh di atas. Gambar grafik fungsi asli dan fungsi turunannya pada sumbu koordi

### 1. Turunan fungsi polinomial

```
>function f(x) &= x^3 - 5*x^2 + 6*x - 1
```

$$x^3 - 5x^2 + 6x - 1$$

```
>$diff(f(x), x)
>$diff(f(x), x, 2)
>plot2d("f(x)", -2, 6, title="f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x - 1"):
```

### 2. Turunan fungsi trigonometri

```
>function g(x) &= sin(x)*cos(x)
```

$$\cos(x) \sin(x)$$

```
>$diff(g(x), x)
>plot2d("g(x)")
```

### 3. Turunan fungsi eksponensial dan logaritmik

```
>function h(x) &= exp(2*x)*log(x)
```

$$e^{2x} \log(x)$$

```
>$diff(h(x), x)
>diff(h(x), x, 2)
```

```
Variable or function x not found.
Error in:
diff(h(x), x, 2) ...
^
```

### 4. Turunan fungsi rasional

```
>function r(x) &= (x^2 + 2*x - 3)/(x - 1)
```

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$$

```
>$diff(r(x), x)
```

## Integral

EMT dapat digunakan untuk menghitung integral, baik integral tak tentu maupun integral tentu. Untuk integral tak tentu (simbolik) sudah tentu EMT menggunakan Maxima, sedangkan untuk perhitungan integral tentu EMT sudah menyediakan beberapa fungsi yang mengimplementasikan algoritma kuadratur (perhitungan integral tentu menggunakan metode numerik).

Pada notebook ini akan ditunjukkan perhitungan integral tentu dengan menggunakan Teorema Dasar Kalkulus:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad \text{dengan } F'(x) = f(x).$$

Fungsi untuk menentukan integral adalah integrate. Fungsi ini dapat digunakan untuk menentukan, baik integral tentu maupun tak tentu (jika fungsinya memiliki antiderivatif). Untuk perhitungan integral tentu fungsi integrate menggunakan metode numerik (kecuali fungsinya tidak integrabel, kita tidak akan menggunakan metode ini).

```
>$showev('integrate(x^n,x))
```

Answering "Is n equal to -1?" with "no"

```
>$showev('integrate(1/(1+x),x))
>$showev('integrate(1/(1+x^2),x))
>$showev('integrate(1/sqrt(1-x^2),x))
>$showev('integrate(sin(x),x,0,pi))
>plot2d("sin(x)",0,2*pi):
>$showev('integrate(sin(x),x,a,b))
>$showev('integrate(x^n,x,a,b))
```

Answering "Is n positive, negative or zero?" with "positive"

```
>$showev('integrate(x^2*sqrt(2*x+1),x))
>$showev('integrate(x^2*sqrt(2*x+1),x,0,2))
>$ratsimp(%)
>$showev('integrate((sin(sqrt(x)+a)*E^sqrt(x))/sqrt(x),x,0,pi^2))
>$factor(%)
>function map f(x) &= E^(-x^2)
```

$$-\frac{2}{x}$$

E

```
>$showev('integrate(f(x),x))
```

Fungsi  $f$  tidak memiliki antiturunan, integralnya masih memuat integral lain.

$$\operatorname{erf}(x) = \int \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}} dx.$$

Kita tidak dapat menggunakan teorema Dasar kalkulus untuk menghitung integral tentu fungsi tersebut jika Dalam hal ini dapat digunakan metode numerik (rumus kuadratur).

Misalkan kita akan menghitung:

```
maxima: 'integrate(f(x),x,0,pi)
```

```
>x:=0:0.1:pi-0.1; plot2d(x,f(x+0.1),>bar); plot2d("f(x)",0,pi,>add):
```

Integral tentu

```
maxima: 'integrate(f(x),x,0,pi)
```

dapat dihampiri dengan jumlah luas persegi-persegi panjang di bawah kurva  $y=f(x)$  tersebut. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

```
>t &= makelist(a,a,0,pi-0.1,0.1); // t sebagai list untuk menyimpan nilai-nilai x
>fx &= makelist(f(t[i]+0.1),i,1,length(t)); // simpan nilai-nilai f(x)
>// jangan menggunakan x sebagai list, kecuali Anda pakar Maxima!
```

Hasilnya adalah:

```
maxima: 'integrate(f(x),x,0,pi) = 0.1*sum(fx[i],i,1,length(fx))
```

Jumlah tersebut diperoleh dari hasil kali lebar sub-subinterval (=0.1) dan jumlah nilai-nilai  $f(x)$  untuk  $x = 0.1, 0.2, 0.3, \dots, 3.2$ .

```
>0.1*sum(f(x+0.1)) // cek langsung dengan perhitungan numerik EMT
```

```
0.836219610253
```

Untuk mendapatkan nilai integral tentu yang mendekati nilai sebenarnya, lebar sub-intervalnya dapat diperkecil lagi, sehingga daerah di bawah kurva tertutup semuanya dapat digunakan lebar subinterval 0.001. (Silakan dicoba!)

Meskipun Maxima tidak dapat menghitung integral tentu fungsi tersebut untuk batas-batas yang berhingga, namun integral tersebut dapat dihitung secara eksak jika batas-batasnya tak hingga. Ini adalah salah satu keajaiban di dalam matematika, yang terbatas tidak dapat dihitung secara eksak, namun yang tak hingga malah dapat dihitung secara eksak.

```
>$showev('integrate(f(x),x,0,inf))
```

Tunjukkan kebenaran hasil di atas!

Berikut adalah contoh lain fungsi yang tidak memiliki antiderivatif, sehingga integral tentunya hanya dapat dihitung dengan metode numerik.

```
>function f(x) &= x^x
```

$$\begin{matrix} x \\ x \end{matrix}$$

```
>$showev('integrate(f(x),x,0,1))
>x:=0:0.1:1-0.01; plot2d(x,f(x+0.01),>bar); plot2d("f(x)",0,1,>add):
```

Maxima gagal menghitung integral tentu tersebut secara langsung menggunakan perintah `integrate`. Berikut kita lakukan seperti contoh sebelumnya untuk mendapat hasil atau pendekatan nilai integral tentu tersebut.

```
>t &= makelist(a,a,0,1-0.01,0.01);
>fx &= makelist(f(t[i]+0.01),i,1,length(t));
```

```
maxima: 'integrate(f(x),x,0,1) = 0.01*sum(fx[i],i,1,length(fx))
```

Apakah hasil tersebut cukup baik? perhatikan gambarnya.

```
>function f(x) &= sin(3*x^5+7)^2
```

$$\sin^2(3x^5 + 7)$$

```
>integrate(f,0,1)
```

```
0.542581176074
```

```
>&showev('integrate(f(x),x,0,1))
```

$$\int_0^1 \sin^2(3x^5 + 7) dx = \frac{\frac{1}{5} \Gamma(-\frac{1}{5}) \sin(14) \sin(\frac{\pi}{10})}{10 \cdot 6^{1/5}} - ((6^{4/5} \Gamma_{\text{incomplete}}(-\frac{1}{5}, 6I) + 6^{4/5} \Gamma_{\text{incomplete}}(\frac{1}{5}, -6I)) \sin(14) + (6^{4/5} I \Gamma_{\text{incomplete}}(-\frac{1}{5}, 6I) - 6^{4/5} I \Gamma_{\text{incomplete}}(\frac{1}{5}, -6I)) \cos(14)) \sin(\frac{\pi}{10}) - 60)/120$$

```
>&float(%)
```

$$\int_0^1 \sin^2(3.0 x^5 + 7.0) dx = 0.09820784258795788 - 0.008333333333333333 (0.3090169943749474 (0.1367372182078336 (4.192962712629476 I \Gamma_{\text{incomplete}}(0.2, 6.0 I) - 4.192962712629476 I \Gamma_{\text{incomplete}}(0.2, -6.0 I)) + 0.9906073556948704 (4.192962712629476 \Gamma_{\text{incomplete}}(0.2, 6.0 I) + 4.192962712629476 \Gamma_{\text{incomplete}}(0.2, -6.0 I))) - 60.0)$$

```
>$showev('integrate(x*exp(-x),x,0,1)) // Integral tentu (eksak)
```

## Aplikasi Integral Tentu

```
>plot2d("x^3-x",-0.1,1.1); plot2d("-x^2",>add); ...
b=solve("x^3-x+x^2",0.5); x=linspace(0,b,200); xi=flipx(x); ...
plot2d(x|xi,x^3-x|-xi^2,>filled,style="|",fillcolor=1,>add): // Plot daerah antara 2 kurva
>a=solve("x^3-x+x^2",0), b=solve("x^3-x+x^2",1) // absis titik-titik potong kedua kurva
```

```
0
0.61803398875
```

```
>integrate("(-x^2)-(x^3-x)",a,b) // luas daerah yang diarsir
```

```
0.0758191713542
```

Hasil tersebut akan kita bandingkan dengan perhitungan secara analitik.

```
>a &= solve((-x^2)-(x^3-x),x); $a // menentukan absis titik potong kedua kurva secara eksak
>$showev('integrate(-x^2-x^3+x,x,0,(sqrt(5)-1)/2)) // Nilai integral secara eksak
>$float(%)
```

## Panjang Kurva

Hitunglah panjang kurva berikut ini dan luas daerah di dalam kurva tersebut.

$$\gamma(t) = (r(t) \cos(t), r(t) \sin(t))$$

dengan

$$r(t) = 1 + \frac{\sin(3t)}{2}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

```
>t=linspace(0,2pi,1000); r=1+sin(3*t)/2; x=r*cos(t); y=r*sin(t); ...
  plot2d(x,y,>filled,fillcolor=red,style="/",r=1.5): // Kita gambar kurvanya terlebih dahulu
>function r(t) &= 1+sin(3*t)/2; $'r(t)=r(t)
>function fx(t) &= r(t)*cos(t); $'fx(t)=fx(t)
>function fy(t) &= r(t)*sin(t); $'fy(t)=fy(t)
>function ds(t) &= trigreduce(radcan(sqrt(diff(fx(t),t)^2+diff(fy(t),t)^2))); $'ds(t)=ds(t)
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... e(radcan(sqrt(diff(fx(t),t)^2+diff(fy(t),t)^2))); $'ds(t)=ds(t ...
      ^
```

```
>$integrate(ds(x),x,0,2*pi) //panjang (keliling) kurva
```

Maxima gagal melakukan perhitungan eksak integral tersebut.

Berikut kita hitung integralnya secara umerik dengan perintah EMT.

```
>integrate("ds(x)",0,2*pi)

Function ds not found.
Try list ... to find functions!
Error in expression: ds(x)
%mapexpression1:
  return expr(x,args());
Error in map.
%evalexpression:
  if maps then return %mapexpression1(x,f$;args());
gauss:
  if maps then y=%evalexpression(f$,a+h-(h*xn)',maps;args());
adaptivegauss:
  tl=gauss(f$,c,c+h;args(),=maps);
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
integrate:
  return adaptivegauss(f$,a,b,eps*1000;args(),=maps);
```

Spiral Logaritmik

$$x = e^{ax} \cos x, \quad y = e^{ax} \sin x.$$

```
>a=0.1; plot2d("exp(a*x)*cos(x)", "exp(a*x)*sin(x)", r=2, xmin=0, xmax=2*pi):
>&kill(a) // hapus ekspresi a
```

done

```
>function fx(t) &= exp(a*t)*cos(t); $'fx(t)=fx(t)
>function fy(t) &= exp(a*t)*sin(t); $'fy(t)=fy(t)
>function df(t) &= trigreduce(radcan(sqrt(diff(fx(t),t)^2+diff(fy(t),t)^2))); $'df(t)=df(t)
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... e(radcan(sqrt(diff(fx(t),t)^2+diff(fy(t),t)^2))); $'df(t)=df(t ...
      ^
```

```
>S &=integrate(df(t),t,0,2*pi); $S // panjang kurva (spiral)
```

```
Maxima said:
defint: variable of integration cannot be a constant; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
S &=integrate(df(t),t,0,2*pi); $S // panjang kurva (spiral) ...
      ^
```

```
>S(a=0.1) // Panjang kurva untuk a=0.1
```

```
Function S not found.
Try list ... to find functions!
Error in:
S(a=0.1) // Panjang kurva untuk a=0.1 ...
      ^
```

Soal:

Tunjukkan bahwa keliling lingkaran dengan jari-jari  $r$  adalah  $K=2\pi.r$ .

Berikut adalah contoh menghitung panjang parabola.

```
>plot2d("x^2",xmin=-1,xmax=1):
>$showev('integrate(sqrt(1+diff(x^2,x)^2),x,-1,1))
>$float(%)
>x=-1:0.2:1; y=x^2; plot2d(x,y); ...
plot2d(x,y,points=1,style="o#",add=1):
```

Panjang tersebut dapat dihipir dengan menggunakan jumlah panjang ruas-ruas garis yang menghubungkan ti tersebut.

```
>i=1:cols(x)-1; sum(sqrt((x[i+1]-x[i])^2+(y[i+1]-y[i])^2))
```

```
2.95191957027
```

Hasilnya mendekati panjang yang dihitung secara eksak. Untuk mendapatkan hampiran yang cukup akurat, jar diperkecil, misalnya 0.1, 0.05, 0.01, dan seterusnya. Cobalah Anda ulangi perhitungannya dengan nilai-ni

## Koordinat Kartesius

Berikut diberikan contoh perhitungan panjang kurva menggunakan koordinat Kartesius. Kita akan hitung par persamaan implisit:

$$x^3 + y^3 - 3xy = 0.$$

```
>z &= x^3+y^3-3*x*y; $z
>plot2d(z,r=2,level=0,n=100):
```

Kita tertarik pada kurva di kuadran pertama.

```
>plot2d(z,a=0,b=2,c=0,d=2,level=[-10;0],n=100,contourwidth=3,style="/"):
```

Kita selesaikan persamaannya untuk  $x$ .

```
>$z with y=1*x, sol &= solve(%,x); $sol
```

Kita gunakan solusi tersebut untuk mendefinisikan fungsi dengan Maxima.

```
>function f(l) &= rhs(sol[1]); $'f(l)=f(l)
```

Fungsi tersebut juga dapat digunaka untuk menggambar kurvanya. Ingat, bahwa fungsi tersebut adalah nilai  $x=f(l)$  dan  $y=1*f(l)$ .

```
>plot2d(&f(x),&x*f(x),xmin=-0.5,xmax=2,a=0,b=2,c=0,d=2,r=1.5):
```

Elemen panjang kurva adalah:

$$ds = \sqrt{f'(l)^2 + (lf'(l) + f(l))^2}.$$

```
>function ds(l) &= ratsimp(sqrt(diff(f(l),l)^2+diff(1*f(l),l)^2)); $'ds(l)=ds(l)
>$integrate(ds(l),l,0,1)
```

Integral tersebut tidak dapat dihitung secara eksak menggunakan Maxima. Kita hitung integral etrsebut se Karena kurva simetris, kita hitung untuk nilai variabel integrasi dari 0 sampai 1, kemudian hasilnya dik

```
>2*integrate("ds(x)",0,1)
```

```
4.91748872168
```

```
>2*romberg(&ds(x),0,1)// perintah Euler lain untuk menghitung nilai hampiran integral yang sama
```

```
4.91748872168
```

Perhitungan di atas dapat dilakukan untuk sebarang fungsi  $x$  dan  $y$  dengan mendefinisikan fungsi EMT, mis panjangkurva. Fungsi ini selalu memanggil Maxima untuk menurunkan fungsi yang diberikan.

```

>function panjangkurva(fx,fy,a,b) ...
ds=mxm("sqrt(diff(@fx,x)^2+diff(@fy,x)^2)");
return romberg(ds,a,b);
endfunction

>panjangkurva("x","x^2",-1,1) // cek untuk menghitung panjang kurva parabola sebelumnya

2.95788571509

Bandingkan dengan nilai eksak di atas.

>2*panjangkurva(mxm("f(x)",mxm("x*f(x)"),0,1) // cek contoh terakhir, bandingkan hasilnya!

4.91748872168

Kita hitung panjang spiral Archimides berikut ini dengan fungsi tersebut.

>plot2d("x*cos(x)","x*sin(x)",xmin=0,xmax=2*pi,square=1):
>panjangkurva("x*cos(x)","x*sin(x)",0,2*pi)

21.2562941482

Berikut kita definisikan fungsi yang sama namun dengan Maxima, untuk perhitungan eksak.

>&kill(ds,x,fx,fy)

done

>function ds(fx,fy) &&= sqrt(diff(fx,x)^2+diff(fy,x)^2)

sqrt(diff (fy, x) + diff (fx, x))

>sol &= ds(x*cos(x),x*sin(x)); $sol // Kita gunakan untuk menghitung panjang kurva terakhir di atas
>$sol | trigreduce | expand, $integrate(%,x,0,2*pi), %()

21.2562941482

Hasilnya sama dengan perhitungan menggunakan fungsi EMT.

Berikut adalah contoh lain penggunaan fungsi Maxima tersebut.

>plot2d("3*x^2-1","3*x^3-1",xmin=-1/sqrt(3),xmax=1/sqrt(3),square=1):
>sol &= radcan(ds(3*x^2-1,3*x^3-1)); $sol
>$showev('integrate(sol,x,0,1/sqrt(3))), $2*float(%) // panjang kurva di atas

```

## Sikloid

Berikut kita akan menghitung panjang kurva lintasan (sikloid) suatu titik pada lingkaran yang berputar k datar. Misalkan jari-jari lingkaran tersebut adalah  $r$ . Posisi titik pusat lingkaran pada saat  $t$  adalah:

$$(rt, r).$$

Misalkan posisi titik pada lingkaran tersebut mula-mula  $(0,0)$  dan posisinya pada saat  $t$  adalah:

$$(r(t - \sin(t)), r(1 - \cos(t))).$$

Berikut kita plot lintasan tersebut dan beberapa posisi lingkaran ketika  $t=0$ ,  $t=\pi/2$ ,  $t=r\pi$ .

```

>x &= r*(t-sin(t))

[0, 1.66665833335744e-7 r, 1.33330666692022e-6 r,
4.499797504338432e-6 r, 1.066581336583994e-5 r,
2.083072932167196e-5 r, 3.599352055540239e-5 r,
5.71526624672386e-5 r, 8.530603082730626e-5 r,
1.214508019889565e-4 r, 1.665833531718508e-4 r,
2.216991628251896e-4 r, 2.877927110806339e-4 r,
3.658573803051457e-4 r, 4.568853557635201e-4 r,
5.618675264007778e-4 r, 6.817933857540259e-4 r,
8.176509330039827e-4 r, 9.704265741758145e-4 r,

```

```

0.001141105023499428 r, 0.001330669204938795 r,
0.001540100153900437 r, 0.001770376919130678 r,
0.002022476464811601 r, 0.002297373572865413 r,
0.002596040745477063 r, 0.002919448107844891 r,
0.003268563311168871 r, 0.003644351435886262 r,
0.004047774895164447 r, 0.004479793338660443 r, 0.0049413635565565 r,
0.005433439383882244 r, 0.005956971605131645 r,
0.006512907859185624 r, 0.007102192544548636 r,
0.007725766724910044 r, 0.00838456803503801 r,
0.009079530587017326 r, 0.009811584876838586 r, 0.0105816576913495 r,
0.01139067201557714 r, 0.01223954694042984 r, 0.01312919757078923 r,
0.01406053493400045 r, 0.01503446588876983 r, 0.01605189303448024 r,
0.01711371462093175 r, 0.01822082445851714 r, 0.01937411182884202 r,
0.02057446139579705 r, 0.02182275311709253 r, 0.02311986215626333 r,
0.02446665879515308 r, 0.02586400834688696 r, 0.02731277106934082 r,
0.02881380207911666 r, 0.03036795126603076 r, 0.03197606320812652 r,
0.0336389770872163 r, 0.03535752660496472 r, 0.03713253989951881 r,
0.03896483946269502 r, 0.0408552420577305 r, 0.04280455863760801 r,
0.04481359426396048 r, 0.04688314802656623 r, 0.04901401296344043 r,
0.05120697598153157 r, 0.05346281777803219 r, 0.05578231276230905 r,
0.05816622897846346 r, 0.06061532802852698 r, 0.0631303649963022 r,
0.06571208837185505 r, 0.06836123997666599 r, 0.07107855488944881 r,
0.07386476137264342 r, 0.07672058079958999 r, 0.07964672758239233 r,
0.08264390910047736 r, 0.0857128256298576 r, 0.08885417027310427 r,
0.09206862889003742 r, 0.09535688002914089 r, 0.0987195948597075 r,
0.1021574371047232 r, 0.1056710629744951 r, 0.1092611211010309 r,
0.1129282524731764 r, 0.1166730903725168 r, 0.1204962603100498 r,
0.1243983799636342 r, 0.1283800591162231 r, 0.1324418995948859 r,
0.1365844952106265 r, 0.140808431699002 r, 0.1451142866615502 r,
0.1495026295080298 r, 0.1539740213994798 r]

```

```
>y &= r*(1-cos(t))
```

```

[0, 4.999958333473664e-5 r, 1.999933334222437e-4 r,
4.499662510124569e-4 r, 7.998933390220841e-4 r,
0.001249739605033717 r, 0.00179946006479581 r,
0.002448999746720415 r, 0.003198293697380561 r,
0.004047266988005727 r, 0.004995834721974179 r,
0.006043902043303184 r, 0.00719136414613375 r, 0.00843810628521191 r,
0.009784003787362772 r, 0.01122892206395776 r, 0.01277271662437307 r,
0.01441523309043924 r, 0.01615630721187855 r, 0.01799576488272969 r,
0.01993342215875837 r, 0.02196908527585173 r, 0.02410255066939448 r,
0.02633360499462523 r, 0.02866202514797045 r, 0.03108757828935527 r,
0.03361002186548678 r, 0.03622910363410947 r, 0.03894456168922911 r,
0.04175612448730281 r, 0.04466351087439402 r, 0.04766643011428662 r,
0.05076458191755917 r, 0.0539576564716131 r, 0.05724533447165381 r,
0.06062728715262111 r, 0.06410317632206519 r, 0.06767265439396564 r,
0.07133536442348987 r, 0.07509094014268702 r, 0.07893900599711501 r,
0.08287917718339499 r, 0.08691105968769186 r, 0.09103425032511492 r,
0.09524833678003664 r, 0.09955289764732322 r, 0.1039475024744748 r,
0.1084317118046711 r, 0.113005077220716 r, 0.1176671413898787 r,
0.1224174381096274 r, 0.1272554923542488 r, 0.1321808203223502 r,
0.1371929294852391 r, 0.1422913186361759 r, 0.1474754779404944 r,
0.152744888986584 r, 0.1580990248377314 r, 0.1635373500848132 r,
0.1690593208998367 r, 0.1746643850903219 r, 0.1803519821545206 r,
0.1861215433374662 r, 0.1919724916878484 r, 0.1979042421157076 r,
0.2039162014509444 r, 0.2100077685026351 r, 0.216178334119151 r,
0.2224272812490723 r, 0.2287539850028937 r, 0.2351578127155118 r,
0.2416381240094921 r, 0.2481942708591053 r, 0.2548255976551299 r,
0.2615314412704124 r, 0.2683111311261794 r, 0.2751639892590951 r,
0.2820893303890569 r, 0.2890864619877229 r, 0.2961546843477643 r,
0.3032932906528349 r, 0.3105015670482534 r, 0.3177787927123868 r,
0.3251242399287333 r, 0.3325371741586922 r, 0.3400168541150183 r,
0.3475625318359485 r, 0.3551734527599992 r, 0.3628488558014202 r,
0.3705879734263036 r, 0.3783900317293359 r, 0.3862542505111889 r,
0.3941798433565377 r, 0.4021660177127022 r, 0.4102119749689023 r,
0.418316910536117 r, 0.4264800139275439 r, 0.4347004688396462 r,
0.4429774532337832 r, 0.451310139418413 r]

```

Berikut kita gambar sikloid untuk  $r=1$ .

```

>ex &= x-sin(x); ey &= 1-cos(x); aspect(1);
>plot2d(ex,ey,xmin=0,xmax=4pi,square=1); ...
plot2d("2*cos(x)", "1+sin(x)",xmin=0,xmax=2pi,>add,color=blue); ...
plot2d([2,ex(2)], [1,ey(2)],color=red,>add); ...
plot2d(ex(2),ey(2),>points,>add,color=red); ...
plot2d("2pi*cos(x)", "1+sin(x)",xmin=0,xmax=2pi,>add,color=blue); ...
plot2d([2pi,ex(2pi)], [1,ey(2pi)],color=red,>add); ...
plot2d(ex(2pi),ey(2pi),>points,>add,color=red);

```

```
Error : [0,1.66665833335744e-7*r-sin(1.66665833335744e-7*r),1.33330666692022e-6*r-sin(1.33330666692022e-6*
```

```
Error generated by error() command
```

```

adaptiveeval:
  error(f$| " does not produce a real or column vector");
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
plot2d:
  dw/n,dw/n^2,dw/n;args());

```

Berikut dihitung panjang lintasan untuk 1 putaran penuh. (Jangan salah menduga bahwa panjang lintasan 1 keliling lingkaran!)

```

>ds &= radcan(sqrt(diff(ex,x)^2+diff(ey,x)^2)); $ds=trigsimp(ds) // elemen panjang kurva sikloid

Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexpl
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
ds &= radcan(sqrt(diff(ex,x)^2+diff(ey,x)^2)); $ds=trigsimp(ds ...

>ds &= trigsimp(ds); $ds
>$showev('integrate(ds,x,0,2*pi)) // hitung panjang sikloid satu putaran penuh

Maxima said:
defint: variable of integration must be a simple or subscripted variable.
defint: found errexpl
#0: showev(f='integrate(ds,[0,1.66665833335744e-7*r,1.33330666692022e-6*r,4.499797504338432e-6*r,1.0665811
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
$showev('integrate(ds,x,0,2*pi)) // hitung panjang sikloid sat ...

>integrate(mxm("ds"),0,2*pi) // hitung secara numerik

Illegal function result in map.
%evalexpression:
  if maps then return %mapexpression1(x,f$,args());
gauss:
  if maps then y=%evalexpression(f$,a+h-(h*xn)',maps,args());
adaptivegauss:
  t1=gauss(f$,c,c+h;args(),=maps);
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
integrate:
  return adaptivegauss(f$,a,b,eps*1000;args(),=maps);

>romberg(mxm("ds"),0,2*pi) // cara lain hitung secara numerik

Wrong argument!

Cannot combine a symbolic expression here.
Did you want to create a symbolic expression?
Then start with &.

Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
romberg:
  if cols(y)==1 then return y*(b-a); endif;
Error in:
romberg(mxm("ds"),0,2*pi) // cara lain hitung secara numerik ...

```

Perhatikan, seperti terlihat pada gambar, panjang sikloid lebih besar daripada keliling lingkarannya, ya

$$2\pi.$$

## Kurvatur (Kelengkungan) Kurva

image: Osculating.png

Aslinya, kelengkungan kurva diferensiabel (yakni, kurva mulus yang tidak lancip) di titik P didefinisikan oskulasi (yaitu, lingkaran yang melalui titik P dan terbaik memperkirakan, paling banyak menyinggung kurva) dan radius kelengkungan kurva di P adalah pusat dan radius lingkaran oskulasi. Kelengkungan adalah kebalikan dari radius kelengkungan:

$$\kappa = \frac{1}{R}$$

dengan R adalah radius kelengkungan. (Setiap lingkaran memiliki kelengkungan ini pada setiap titiknya, c lingkaran berputar  $2\pi$  sejauh  $2\pi R$ .) Definisi ini sulit dimanipulasi dan dinyatakan ke dalam rumus untuk kurva umum. Oleh karena itu digunakan ekuivalen.

## Definisi Kurvatur dengan Fungsi Parametrik Panjang Kurva

Setiap kurva diferensiabel dapat dinyatakan dengan persamaan parametrik terhadap panjang kurva s:

$$\gamma(s) = (x(s), y(s)),$$

dengan x dan y adalah fungsi riil yang diferensiabel, yang memenuhi:

$$\|\gamma'(s)\| = \sqrt{x'(s)^2 + y'(s)^2} = 1.$$

Ini berarti bahwa vektor singgung

$$\mathbf{T}(s) = (x'(s), y'(s))$$

memiliki norm 1 dan merupakan vektor singgung satuan.

Apabila kurvanya memiliki turunan kedua, artinya turunan kedua  $x$  dan  $y$  ada, maka  $\mathbf{T}'(s)$  ada. Vektor ini mengarahnya menuju pusat kurvatur, norm-nya merupakan nilai kurvatur (kelengkungan):

$$\begin{aligned}\mathbf{T}(s) &= \gamma'(s), \\ \mathbf{T}^2(s) &= 1 \text{ (konstanta)} \Rightarrow \mathbf{T}'(s) \cdot \mathbf{T}(s) = 0 \\ \kappa(s) &= \|\mathbf{T}'(s)\| = \|\gamma''(s)\| = \sqrt{x''(s)^2 + y''(s)^2}.\end{aligned}$$

Nilai

$$R(s) = \frac{1}{\kappa(s)}$$

disebut jari-jari (radius) kelengkungan kurva.

Bilangan riil

$$k(s) = \pm \kappa(s)$$

disebut nilai kelengkungan bertanda.

Contoh:

Akan ditentukan kurvatur lingkaran

$$x = r \cos t, \quad y = r \sin t.$$

```
>fx &= r*cos(t); fy &= r*sin(t);
>&assume(t>0,r>0); s &=integrate(sqrt(diff(fx,t)^2+diff(fy,t)^2),t,0,t); s // elemen panjang kurva, panjang bu
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexpl
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... =integrate(sqrt(diff(fx,t)^2+diff(fy,t)^2),t,0,t); s // elemen ...
^
```

```
>&kill(s); fx &= r*cos(s/r); fy &= r*sin(s/r); // definisi ulang persamaan parametrik terhadap s dengan substit
>k &= trigsimp(sqrt(diff(fx,s,2)^2+diff(fy,s,2)^2)); $k // nilai kurvatur lingkaran dengan menggunakan definis
```

Untuk representasi parametrik umum, misalkan

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

merupakan persamaan parametrik untuk kurva bidang yang terdiferensialkan dua kali. Kurvatur untuk kurva sebagai

$$\begin{aligned}\kappa &= \frac{d\phi}{ds} = \frac{\frac{d\phi}{dt}}{\frac{ds}{dt}} \quad (\phi \text{ adalah sudut kemiringan garis singgung dan } s \text{ adalah panjang kurva}) \\ &= \frac{\frac{d\phi}{dt}}{\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}} = \frac{\frac{d\phi}{dt}}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}.\end{aligned}$$

Selanjutnya, pembilang pada persamaan di atas dapat dicari sebagai berikut.

$$\begin{aligned}\sec^2 \phi \frac{d\phi}{dt} &= \frac{d}{dt}(\tan \phi) = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{dy/dt}{dx/dt} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{y'(t)}{x'(t)} \right) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2} \\ \frac{d\phi}{dt} &= \frac{1}{\sec^2 \phi} \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \tan^2 \phi} \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \left( \frac{y'(t)}{x'(t)} \right)^2} \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2} \\ &= \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2 + y'(t)^2}.\end{aligned}$$

Jadi, rumus kurvatur untuk kurva parametrik

$$x = x(t), y = y(t)$$

adalah

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$

Jika kurvanya dinyatakan dengan persamaan parametrik pada koordinat kutub

$$x = r(\theta) \cos \theta, y = r(\theta) \sin \theta,$$

maka rumus kurvturnya adalah

$$\kappa(\theta) = \frac{r(\theta)^2 + 2r'(\theta)^2 - r(\theta)r''(\theta)}{(r'(\theta)^2 + r(\theta)^2)^{3/2}}.$$

(Silakan Anda turunkan rumus tersebut!)

Contoh:

Lingkaran dengan pusat (0,0) dan jari-jari r dapat dinyatakan dengan persamaan parametrik

$$x = r \cos t, y = r \sin t.$$

Nilai kelengkungan lingkaran tersebut adalah

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}} = \frac{r^2}{r^3} = \frac{1}{r}.$$

Hasil cocok dengan definisi kurvatur suatu kelengkungan.

Kurva

$$y = f(x)$$

dapat dinyatakan ke dalam persamaan parametrik

$$x = t, y = f(t), \text{ dengan } x'(t) = 1, x''(t) = 0,$$

sehingga kurvturnya adalah

$$\kappa(t) = \frac{y''(t)}{(1 + y'(t)^2)^{3/2}}.$$

Contoh:

Akan ditentukan kurvatur parabola

$$y = ax^2 + bx + c.$$

```
>function f(x) &= a*x^2+b*x+c; $y=f(x)
```

```
>function k(x) &= (diff(f(x),x,2))/(1+diff(f(x),x)^2)^(3/2); $'k(x)=k(x) // kelengkungan parabola
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... (x) &= (diff(f(x),x,2))/(1+diff(f(x),x)^2)^(3/2); $'k(x)=k(x) ...
^
```

```
>function f(x) &= x^2+x+1; $y=f(x) // akan kita plot kelengkungan parabola untuk a=b=c=1
>function k(x) &= (diff(f(x),x,2))/(1+diff(f(x),x)^2)^(3/2); $'k(x)=k(x) // kelengkungan parabola
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... (x) &= (diff(f(x),x,2))/(1+diff(f(x),x)^2)^(3/2); $'k(x)=k(x) ...
^
```

Berikut kita gambar parabola tersebut beserta kurva kelengkungan, kurva jari-jari kelengkungan dan salah di titik puncak parabola. Perhatikan, puncak parabola dan jari-jari lingkaran oskulasi di puncak parabol

$$(-1/2, 3/4), 1/k(2) = 1/2,$$

sehingga pusat lingkaran oskulasi adalah  $(-1/2, 5/4)$ .

```
>plot2d(["f(x)", "k(x)"],-2,1, color=[blue,red]); plot2d("1/k(x)",-1.5,1,color=green,>add); ...
plot2d("-1/2+1/k(-1/2)*cos(x)", "5/4+1/k(-1/2)*sin(x)",xmin=0,xmax=2pi,>add,color=blue):
```

Error : f(x) does not produce a real or column vector

Error generated by error() command

```
%ploteval:
error(f$| " does not produce a real or column vector");
adaptiveevalone:
s=%ploteval(g$,t,args());
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
plot2d:
dw/n,dw/n^2,dw/n,auto,args());
```

Untuk kurva yang dinyatakan dengan fungsi implisit

$$F(x,y) = 0$$

dengan turunan-turunan parsial

$$F_x = \frac{\partial F}{\partial x}, F_y = \frac{\partial F}{\partial y}, F_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial F}{\partial x} \right), F_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial F}{\partial x} \right), F_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial F}{\partial y} \right),$$

berlaku

$$F_x dx + F_y dy = 0 \text{ atau } \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y},$$

sehingga kurvturnya adalah

$$\kappa = \frac{F_y^2 F_{xx} - 2 F_x F_y F_{xy} + F_x^2 F_{yy}}{(F_x^2 + F_y^2)^{3/2}}.$$

(Silakan Anda turunkan sendiri!)

Contoh 1:  
Parabola

$$y = ax^2 + bx + c$$

dapat dinyatakan ke dalam persamaan implisit

$$ax^2 + bx + c - y = 0.$$

```
>function F(x,y) &=a*x^2+b*x+c-y; $F(x,y)
>Fx &= diff(F(x,y),x), Fxx &=diff(F(x,y),x,2), Fy &=diff(F(x,y),y), Fxy &=diff(diff(F(x,y),x),y), Fyy &=diff(F
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
Fx &= diff(F(x,y),x), Fxx &=diff(F(x,y),x,2), Fy &=diff(F(x,y) ...
^

>function k(x) &= (Fy^2*Fxx-2*Fx*Fy*Fxy+Fx^2*Fyy)/(Fx^2+Fy^2)^(3/2); $k(x)=k(x) // kurvatur parabola tersebut

Hasilnya sama dengan sebelumnya yang menggunakan persamaan parabola biasa.
```

## Latihan

- Bukalah buku Kalkulus.
- Cari dan pilih beberapa (paling sedikit 5 fungsi berbeda tipe/bentuk/jenis) fungsi dari buku tersebut, EMT pada baris-baris perintah berikut (jika perlu tambahkan lagi).
- Untuk setiap fungsi, tentukan anti turunannya (jika ada), hitunglah integral tentu dengan batas-batas tentukan sendiri), seperti contoh-contoh tersebut.
- Lakukan hal yang sama untuk fungsi-fungsi yang tidak dapat diintegralkan (cari sedikitnya 3 fungsi).
- Gambar grafik fungsi dan daerah integrasinya pada sumbu koordinat yang sama.
- Gunakan integral tentu untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva yang berpotongan di dua kedua kurva dan arsir (warnai) daerah yang dibatasi oleh keduanya.)
- Gunakan integral tentu untuk menghitung volume benda putar kurva  $y = f(x)$  yang diputar mengelilingi sum yakni

$$V = \int_a^b \pi(f(x))^2 dx.$$

(Pilih fungsinya dan gambar kurva dan benda putar yang dihasilkan. Anda dapat mencari contoh-contoh baga benda hasil perputaran suatu kurva.)

- Gunakan integral tentu untuk menghitung panjang kurva  $y=f(x)$  dari  $x=a$  sampai  $x=b$  dengan menggunakan ru

$$S = \int_a^b \sqrt{1+(f'(x))^2} dx.$$

(Pilih fungsi dan gambar kurvanya.)

- Apabila fungsi dinyatakan dalam koordinat kutub  $x=f(r,t)$ ,  $y=g(r,t)$ ,  $r=h(t)$ ,  $x=a$  bersesuaian dengan  $t=t$  dengan  $t=t_1$ , maka rumus di atas akan menjadi:

$$S = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

- Pilih beberapa kurva menarik (selain lingkaran dan parabola) dari buku kalkulus. Nyatakan setiap kurv
  - a. koordinat Kartesius (persamaan  $y=f(x)$ )
  - b. koordinat kutub ( $r=r(\theta)$ )
  - c. persamaan parametrik  $x=x(t)$ ,  $y=y(t)$
  - d. persamaan implit  $F(x,y)=0$
- Tentukan kurvatur masing-masing kurva dengan menggunakan keempat representasi tersebut (hasilnya harus
- Gambarkan kurva asli, kurva kurvatur, kurva jari-jari lingkaran oskulasi, dan salah satu lingkaran osk

```
>function f(x) &= 3*x^2 - 4*x + 5
```

```

      2
[5, 8.333250000449399e-14 r  - 6.66663333429761e-7 r + 5,
      2
5.333120004161718e-12 r  - 5.333226667680879e-6 r + 5,
      2
6.074453274015114e-11 r  - 1.799919001735373e-5 r + 5,
      2
3.412787242647896e-10 r  - 4.266325346335975e-5 r + 5,
      2
1.301757852218292e-9 r  - 8.332291728668784e-5 r + 5,
      2
3.886600565916524e-9 r  - 1.439740822216096e-4 r + 5,
      2
9.799280481282313e-9 r  - 2.286106498689544e-4 r + 5,
      2
2.183135668652798e-8 r  - 3.41224123309225e-4 r + 5,
      2
4.425089191128218e-8 r  - 4.858032079558261e-4 r + 5,
      2
8.325004066193272e-8 r  - 6.663334126874032e-4 r + 5,
      2
1.474515563921698e-7 r  - 8.867966513007586e-4 r + 5,
      2
2.484739336534236e-7 r  - 0.001151170844322535 r + 5,
      2
4.01554868171232e-7 r  - 0.001463429521220583 r + 5,
      2
6.262326849334746e-7 r  - 0.00182754142305408 r + 5,
      2
```

```

9.470853516711859e-7 r - 0.002247470105603111 r + 5,
2
1.394526662573814e-6 r - 0.002727173543016104 r + 5,
2
2.005659144726851e-6 r - 0.003270603732015931 r + 5,
2
2.825183207599822e-6 r - 0.003881706296703258 r + 5,
2
3.90636202396689e-6 r - 0.004564420093997712 r + 5,
2
5.312041598917332e-6 r - 0.005322676819755179 r + 5,
2
7.115725452132445e-6 r - 0.006160400615601747 r + 5,
2
9.402703307371898e-6 r - 0.007081507676522714 r + 5,
2
1.22712331521505e-5 r - 0.008089905859246405 r + 5,
2
1.583377599990118e-5 r - 0.009189494291461653 r + 5,
2
2.021828265653131e-5 r - 0.01038416298190825 r + 5,
2
2.556953176319735e-5 r - 0.01167779243137956 r + 5,
2
3.205051835735763e-5 r - 0.01307425324467548 r + 5,
2
3.984389216473878e-5 r - 0.01457740574354505 r + 5,
2
4.915344480577065e-5 r - 0.01619109958065779 r + 5,
2
6.020564507131942e-5 r - 0.01791917335464177 r + 5,
2
7.325122139419409e-5 r - 0.019765454226226 r + 5,
2
8.856679061496796e-5 r - 0.02173375753552897 r + 5,
2
1.06456532113034e-4 r - 0.02382788642052658 r + 5,
2
1.272539063467256e-4 r - 0.0260516314367425 r + 5,
2
1.513234168195267e-4 r - 0.02840877017819454 r + 5,
2
1.790624144631818e-4 r - 0.03090306689964017 r + 5,
2
2.109029434025434e-4 r - 0.03353827214015204 r + 5,
2
2.473136270417496e-4 r - 0.0363181223480693 r + 5,
2
2.88801593386223e-4 r - 0.03924633950735434 r + 5,
2
3.359144384906881e-4 r - 0.042326630765398 r + 5,
2
3.892422268993567e-4 r - 0.04556268806230857 r + 5,
2
4.49419527920956e-4 r - 0.04895818776171934 r + 5,
2
5.171274865584534e-4 r - 0.05251679028315692 r + 5,
2
5.930959278907408e-4 r - 0.05624213973600178 r + 5,
2
6.78105493681751e-4 r - 0.06013786355507933 r + 5,
2
7.729898099711854e-4 r - 0.06420757213792094 r + 5,
2
8.786376843800797e-4 r - 0.06845485848372701 r + 5,
2
9.959953318442892e-4 r - 0.07288329783406855 r + 5,
2
0.001126068627469429 r - 0.07749644731536809 r + 5,
2
0.001269925385181429 r - 0.0822978455831882 r + 5,
2
0.001428697660828715 r - 0.08729101246837012 r + 5,
2
0.001603584078373852 r - 0.0924794486250533 r + 5,
2
0.001795852177795325 r - 0.09786663518061234 r + 5,
2
0.002006840783303515 r - 0.1034560333875478 r + 5,
2
0.002237962390458663 r - 0.1092510842773633 r + 5,
2
0.002490705570763522 r - 0.1152552083164666 r + 5,
2
0.002766637392288057 r - 0.121471805064123 r + 5,
2
0.003067405854870307 r - 0.1279042528325061 r + 5,
2
0.00339474233842279 r - 0.1345559083488652 r + 5,
2
0.003750464062862364 r - 0.1414301064198589 r + 5,
2
0.00413647655816807 r - 0.1485301595980753 r + 5,
2
0.004554776143060786 r - 0.1558593578507801 r + 5,
2
0.005007452410787254 r - 0.163420968230922 r + 5,
2
0.005496690720481269 r - 0.1712182345504321 r + 5,
2
0.006024774692564614 r - 0.1792543770558419 r + 5,
2
0.006594088706642764 r - 0.1875325921062649 r + 5,
2

```

```

0.007207120400340921 r - 0.1960560518537617 r + 5,
2
0.007866463167519452 r - 0.2048279039261263 r + 5,
2
0.008574818654301226 r - 0.2138512711121288 r + 5,
2
0.009334999251336202 r - 0.2231292510492362 r + 5,
2
0.01014993058072513 r - 0.2326649159138539 r + 5,
2
0.01102265397601779 r - 0.2424613121141079 r + 5,
2
0.01195632895369902 r - 0.2525214599852088 r + 5,
2
0.01295423567457146 r - 0.2628483534874202 r + 5,
2
0.01401977739344195 r - 0.273444959906664 r + 5,
2
0.01515648289551716 r - 0.2843142195577952 r + 5,
2
0.01636800891791267 r - 0.2954590454905737 r + 5,
2
0.01765814255467925 r - 0.30688232319836 r + 5,
2
0.01903080364375145 r - 0.3185869103295693 r + 5,
2
0.0204900471342239 r - 0.3305756364019095 r + 5,
2
0.02204006543236312 r - 0.3428513025194304 r + 5,
2
0.02368519072476542 r - 0.3554166810924171 r + 5,
2
0.0254298972770743 r - 0.3682745155601497 r + 5,
2
0.02727880370667591 r - 0.3814275201165636 r + 5,
2
0.02923667522779436 r - 0.39487837943883 r + 5,
2
0.03130842586741646 r - 0.408629748418893 r + 5,
2
0.03349912065047915 r - 0.4226842518979805 r + 5,
2
0.0358139775276243 r - 0.4370444844041237 r + 5,
2
0.03825837061993641 r - 0.4517130098927056 r + 5,
2
0.04083783005122044 r - 0.4666923614900673 r + 5,
2
0.04355804624612184 r - 0.4819850412401991 r + 5,
2
0.04642487081273014 r - 0.4975935198545369 r + 5,
2
0.0494443187360548 r - 0.5135202364648923 r + 5,
2
0.05262257030490555 r - 0.5297675983795438 r + 5,
2
0.05596597299582499 r - 0.5463379808425062 r + 5,
2
0.05948104331259756 r - 0.5632337267960081 r + 5,
2
0.06317446857987175 r - 0.580457146646201 r + 5,
2
0.0670531086894457 r - 0.5980105180321194 r + 5,
2
0.07112399779778239 r - 0.6158960855979192 r + 5]

```

```
>$integrate(f(x), x)
```

```

Maxima output too long!
Error in:
  $integrate(f(x), x) ...
^

```

```
>plot2d("f(x)"):

```

```
Error : f(x) does not produce a real or column vector
```

```
Error generated by error() command
```

```

%ploteval:
  error(f$| " does not produce a real or column vector");
adaptiveevalone:
  s=%ploteval(g$,t,args());
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
plot2d:
  dw/n,dw/n^2,dw/n,auto,args());

```

```
>function g(x) &= sin(x) + 2*cos(2*x)
```

```

[2, 2 cos(3.333316666714881e-7 r)
+ sin(1.6666583335744e-7 r), 2 cos(2.66661333384044e-6 r)
+ sin(1.33330666692022e-6 r), 2 cos(8.999595008676864e-6 r)
+ sin(4.499797504338432e-6 r), 2 cos(2.133162673167988e-5 r)
+ sin(1.066581336583994e-5 r), 2 cos(4.166145864334392e-5 r)
+ sin(2.083072932167196e-5 r), 2 cos(7.198704111080478e-5 r)
+ sin(3.599352055540239e-5 r), 2 cos(1.143053249344772e-4 r)

```

```

+ sin(5.71526624672386e-5 r), 2 cos(1.706120616546125e-4 r)
+ sin(8.530603082730626e-5 r), 2 cos(2.42901603977913e-4 r)
+ sin(1.214508019889565e-4 r), 2 cos(3.331667063437016e-4 r)
+ sin(1.665833531718508e-4 r), 2 cos(4.433983256503793e-4 r)
+ sin(2.216991628251896e-4 r), 2 cos(5.755854221612677e-4 r)
+ sin(2.877927110806339e-4 r), 2 cos(7.317147606102914e-4 r)
+ sin(3.658573803051457e-4 r), 2 cos(9.137707115270399e-4 r)
+ sin(4.568853557635201e-4 r), 2 cos(0.001123735052801556 r)
+ sin(5.618675264007778e-4 r), 2 cos(0.001363586771508052 r)
+ sin(6.817933857540259e-4 r), 2 cos(0.001635301866007965 r)
+ sin(8.176509330039827e-4 r), 2 cos(0.001940853148351629 r)
+ sin(9.704265741758145e-4 r), 2 cos(0.002282210046998856 r)
+ sin(0.001141105023499428 r), 2 cos(0.002661338409877589 r)
+ sin(0.001330669204938795 r), 2 cos(0.003080200307800873 r)
+ sin(0.001540100153900437 r), 2 cos(0.003540753838261357 r)
+ sin(0.001770376919130678 r), 2 cos(0.004044952929623202 r)
+ sin(0.002022476464811601 r), 2 cos(0.004594747145730826 r)
+ sin(0.002297373572865413 r), 2 cos(0.005192081490954126 r)
+ sin(0.002596040745477063 r), 2 cos(0.005838896215689782 r)
+ sin(0.002919448107844891 r), 2 cos(0.006537126622337741 r)
+ sin(0.003268563311168871 r), 2 cos(0.007288702871772523 r)
+ sin(0.003644351435886262 r), 2 cos(0.008095549790328893 r)
+ sin(0.004047774895164447 r), 2 cos(0.008959586677320885 r)
+ sin(0.004479793338660443 r), 2 cos(0.009882727113112999 r)
+ sin(0.0049413635565565 r), 2 cos(0.01086687876776449 r)
+ sin(0.005433439383882244 r), 2 cos(0.01191394321026329 r)
+ sin(0.005956971605131645 r), 2 cos(0.01302581571837125 r)
+ sin(0.006512907859185624 r), 2 cos(0.01420438508909727 r)
+ sin(0.007102192544548636 r), 2 cos(0.01545153344982009 r)
+ sin(0.007725766724910044 r), 2 cos(0.01676913607007602 r)
+ sin(0.00838456803503801 r), 2 cos(0.01815906117403465 r)
+ sin(0.009079530587017326 r), 2 cos(0.01962316975367717 r)
+ sin(0.009811584876838586 r), 2 cos(0.021163315382699 r)
+ sin(0.0105816576913495 r), 2 cos(0.02278134403115428 r)
+ sin(0.01139067201557714 r), 2 cos(0.02447909388085967 r)
+ sin(0.01223954694042984 r), 2 cos(0.02625839514157846 r)
+ sin(0.01312919757078923 r), 2 cos(0.02812106986800089 r)
+ sin(0.01406053493400045 r), 2 cos(0.03006893177753966 r)
+ sin(0.01503446588876983 r), 2 cos(0.03210378606896047 r)
+ sin(0.01605189303448024 r), 2 cos(0.03422742924186351 r)
+ sin(0.01711371462093175 r), 2 cos(0.03644164891703428 r)
+ sin(0.01822082445851714 r), 2 cos(0.03874822365768404 r)
+ sin(0.01937411182884202 r), 2 cos(0.0411489227915941 r)
+ sin(0.02057446139579705 r), 2 cos(0.04364550623418506 r)
+ sin(0.02182275311709253 r), 2 cos(0.04623972431252665 r)
+ sin(0.02311986215626333 r), 2 cos(0.04893331759030617 r)
+ sin(0.02446665879515308 r), 2 cos(0.05172801669377391 r)
+ sin(0.02586400834688696 r), 2 cos(0.05462554213868165 r)
+ sin(0.02731277106934082 r), 2 cos(0.05762760415823331 r)
+ sin(0.02881380207911666 r), 2 cos(0.06073590253206151 r)
+ sin(0.03036795126603076 r), 2 cos(0.06395212641625303 r)
+ sin(0.03197606320812652 r), 2 cos(0.06727795417443261 r)
+ sin(0.0336389770872163 r), 2 cos(0.07071505320992943 r)
+ sin(0.03535752660496472 r), 2 cos(0.07426507979903763 r)
+ sin(0.03713253989951881 r), 2 cos(0.07792967892539004 r)
+ sin(0.03896483946269502 r), 2 cos(0.081710484115461 r)
+ sin(0.0408552420577305 r), 2 cos(0.08560911727521603 r)
+ sin(0.04280455863760801 r), 2 cos(0.08962718852792095 r)
+ sin(0.04481359426396048 r), 2 cos(0.09376629605313247 r)
+ sin(0.04688314802656623 r), 2 cos(0.09802802592688087 r)
+ sin(0.04901401296344043 r), 2 cos(0.1024139519630631 r)
+ sin(0.05120697598153157 r), 2 cos(0.1069256355560644 r)
+ sin(0.05346281777803219 r), 2 cos(0.1115646255246181 r)
+ sin(0.05578231276230905 r), 2 cos(0.1163324579569269 r)
+ sin(0.05816622897846346 r), 2 cos(0.121230656057054 r)
+ sin(0.06061532802852698 r), 2 cos(0.1262607299926044 r)
+ sin(0.0631303649963022 r), 2 cos(0.1314241767437101 r)
+ sin(0.06571208837185505 r), 2 cos(0.136722479953332 r)
+ sin(0.06836123997666599 r), 2 cos(0.1421571097788976 r)
+ sin(0.07107855488944881 r), 2 cos(0.1477295227452868 r)
+ sin(0.07386476137264342 r), 2 cos(0.15344116159918 r)
+ sin(0.07672058079958999 r), 2 cos(0.1592934551647847 r)
+ sin(0.07964672758239233 r), 2 cos(0.1652878182009547 r)
+ sin(0.08264390910047736 r), 2 cos(0.1714256512597152 r)
+ sin(0.0857128256298576 r), 2 cos(0.1777083405462085 r)
+ sin(0.08885417027310427 r), 2 cos(0.1841372577800748 r)
+ sin(0.09206862889003742 r), 2 cos(0.1907137600582818 r)
+ sin(0.09535688002914089 r), 2 cos(0.197439189719415 r)
+ sin(0.0987195948597075 r), 2 cos(0.2043148742094465 r)
+ sin(0.1021574371047232 r), 2 cos(0.2113421259489903 r)
+ sin(0.1056710629744951 r), 2 cos(0.2185222422020618 r)
+ sin(0.1092611211010309 r), 2 cos(0.2258565049463528 r)
+ sin(0.1129282524731764 r), 2 cos(0.2333461807450337 r)
+ sin(0.1166730903725168 r), 2 cos(0.2409925206200996 r)
+ sin(0.1204962603100498 r), 2 cos(0.2487967599272685 r)
+ sin(0.1243983799636342 r), 2 cos(0.2567601182324462 r)
+ sin(0.1283800591162231 r), 2 cos(0.2648837991897719 r)
+ sin(0.1324418995948859 r), 2 cos(0.2731689904212531 r)
+ sin(0.1365844952106265 r), 2 cos(0.2816168633980041 r)
+ sin(0.140808431699002 r), 2 cos(0.2902285733231005 r)
+ sin(0.1451142866615502 r), 2 cos(0.2990052590160597 r)
+ sin(0.1495026295080298 r), 2 cos(0.3079480427989596 r)
+ sin(0.1539740213994798 r)]

```

```
>function h(x) &= exp(2*x)*log(x)
```

```

Maxima said:
log: encountered log(0).
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

```

```
Error in:
```

```
function h(x) &= exp(2*x)*log(x) ...
```

```
>function r(x) &= (x^2 + 1)/(x^2 + 4)
```

```

1      2      2
2.7777500001498e-14 r + 1  1.777706668053906e-12 r + 1
[-, -----, -----,
4      2      2
2.7777500001498e-14 r + 4  1.777706668053906e-12 r + 4
2.024817758005038e-11 r + 1  1.137595747549299e-10 r + 1
-----, -----,
2      2      2
2.024817758005038e-11 r + 4  1.137595747549299e-10 r + 4
4.339192840727639e-10 r + 1  1.295533521972174e-9 r + 1
-----, -----,
2      2      2
4.339192840727639e-10 r + 4  1.295533521972174e-9 r + 4
3.266426827094104e-9 r + 1  7.277118895509326e-9 r + 1
-----, -----,
2      2      2
3.266426827094104e-9 r + 4  7.277118895509326e-9 r + 4
1.475029730376073e-8 r + 1  2.775001355397757e-8 r + 1
-----, -----,
2      2      2
1.475029730376073e-8 r + 4  2.775001355397757e-8 r + 4
4.915051879738995e-8 r + 1  8.28246445511412e-8 r + 1
-----, -----,
2      2      2
4.915051879738995e-8 r + 4  8.28246445511412e-8 r + 4
1.33851622723744e-7 r + 1  2.087442283111582e-7 r + 1
-----, -----,
2      2      2
1.33851622723744e-7 r + 4  2.087442283111582e-7 r + 4
3.156951172237287e-7 r + 1  4.64842220857938e-7 r + 1
-----, -----,
2      2      2
3.156951172237287e-7 r + 4  4.64842220857938e-7 r + 4
6.685530482422835e-7 r + 1  9.417277358666075e-7 r + 1
-----, -----,
2      2      2
6.685530482422835e-7 r + 4  9.417277358666075e-7 r + 4
1.30212067465563e-6 r + 1  1.770680532972444e-6 r + 1
-----, -----,
2      2      2
1.30212067465563e-6 r + 4  1.770680532972444e-6 r + 4
2.371908484044149e-6 r + 1  3.134234435790633e-6 r + 1
-----, -----,
2      2      2
2.371908484044149e-6 r + 4  3.134234435790633e-6 r + 4
4.090411050716832e-6 r + 1  5.277925333300395e-6 r + 1
-----, -----,
2      2      2
4.090411050716832e-6 r + 4  5.277925333300395e-6 r + 4
6.739427552177103e-6 r + 1  8.523177254399114e-6 r + 1
-----, -----,
2      2      2
6.739427552177103e-6 r + 4  8.523177254399114e-6 r + 4
1.068350611911921e-5 r + 1  1.328129738824626e-5 r + 1
-----, -----,
2      2      2
1.068350611911921e-5 r + 4  1.328129738824626e-5 r + 4
1.638448160192355e-5 r + 1  2.006854835710647e-5 r + 1
-----, -----,
2      2      2
1.638448160192355e-5 r + 4  2.006854835710647e-5 r + 4
2.44170737980647e-5 r + 1  2.952226353832265e-5 r + 1
-----, -----,
2      2      2
2.44170737980647e-5 r + 4  2.952226353832265e-5 r + 4
3.548551070434468e-5 r + 1  4.241796878224187e-5 r + 1
-----, -----,
2      2      2
3.548551070434468e-5 r + 4  4.241796878224187e-5 r + 4
5.044113893984222e-5 r + 1  5.968747148772726e-5 r + 1
-----, -----,
2      2      2
5.044113893984222e-5 r + 4  5.968747148772726e-5 r + 4
7.030098113418114e-5 r + 1  8.243787568058321e-5 r + 1
-----, -----,
2      2      2
7.030098113418114e-5 r + 4  8.243787568058321e-5 r + 4
9.626719779540763e-5 r + 1  1.11971479496896e-4 r + 1
-----, -----,
2      2      2
9.626719779540763e-5 r + 4  1.11971479496896e-4 r + 4

```

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| -----,                               | -----,                               |
| $9.626719779540763e-5 \quad r^2 + 4$ | $1.11971479496896e-4 \quad r^2 + 4$  |
| $1.297474089664522e-4 \quad r^2 + 1$ | $1.498065093069853e-4 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $1.297474089664522e-4 \quad r^2 + 4$ | $1.498065093069853e-4 \quad r^2 + 4$ |
| $1.723758288528179e-4 \quad r^2 + 1$ | $1.976986426302469e-4 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $1.723758288528179e-4 \quad r^2 + 4$ | $1.976986426302469e-4 \quad r^2 + 4$ |
| $2.260351645605837e-4 \quad r^2 + 1$ | $2.576632699903951e-4 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $2.260351645605837e-4 \quad r^2 + 4$ | $2.576632699903951e-4 \quad r^2 + 4$ |
| $2.928792281266932e-4 \quad r^2 + 1$ | $3.319984439480964e-4 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $2.928792281266932e-4 \quad r^2 + 4$ | $3.319984439480964e-4 \quad r^2 + 4$ |
| $3.753562091564763e-4 \quad r^2 + 1$ | $4.233084617271431e-4 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $3.753562091564763e-4 \quad r^2 + 4$ | $4.233084617271431e-4 \quad r^2 + 4$ |
| $4.762325536095718e-4 \quad r^2 + 1$ | $5.34528026124617e-4 \quad r^2 + 1$  |
| -----,                               | -----,                               |
| $4.762325536095718e-4 \quad r^2 + 4$ | $5.34528026124617e-4 \quad r^2 + 4$  |
| $5.986173925984417e-4 \quad r^2 + 1$ | $6.689469277678383e-4 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $5.986173925984417e-4 \quad r^2 + 4$ | $6.689469277678383e-4 \quad r^2 + 4$ |
| $7.459874634862211e-4 \quad r^2 + 1$ | $8.302351902545073e-4 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $7.459874634862211e-4 \quad r^2 + 4$ | $8.302351902545073e-4 \quad r^2 + 4$ |
| $9.222124640960191e-4 \quad r^2 + 1$ | $0.001022468618290102 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $9.222124640960191e-4 \quad r^2 + 4$ | $0.001022468618290102 \quad r^2 + 4$ |
| $0.001131580779474263 \quad r^2 + 1$ | $0.001250154687620788 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.001131580779474263 \quad r^2 + 4$ | $0.001250154687620788 \quad r^2 + 4$ |
| $0.001378825519389357 \quad r^2 + 1$ | $0.001518258714353595 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.001378825519389357 \quad r^2 + 4$ | $0.001518258714353595 \quad r^2 + 4$ |
| $0.001669150803595751 \quad r^2 + 1$ | $0.001832230240160423 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.001669150803595751 \quad r^2 + 4$ | $0.001832230240160423 \quad r^2 + 4$ |
| $0.002008258230854871 \quad r^2 + 1$ | $0.002198029568880921 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.002008258230854871 \quad r^2 + 4$ | $0.002198029568880921 \quad r^2 + 4$ |
| $0.002402373466780307 \quad r^2 + 1$ | $0.002622154389173151 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.002402373466780307 \quad r^2 + 4$ | $0.002622154389173151 \quad r^2 + 4$ |
| $0.002858272884767075 \quad r^2 + 1$ | $0.003111666417112067 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.002858272884767075 \quad r^2 + 4$ | $0.003111666417112067 \quad r^2 + 4$ |
| $0.003383310193575043 \quad r^2 + 1$ | $0.003674217992005929 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.003383310193575043 \quad r^2 + 4$ | $0.003674217992005929 \quad r^2 + 4$ |
| $0.003985442984566339 \quad r^2 + 1$ | $0.004318078558190487 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.003985442984566339 \quad r^2 + 4$ | $0.004318078558190487 \quad r^2 + 4$ |
| $0.004673259131147316 \quad r^2 + 1$ | $0.005052160965172387 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.004673259131147316 \quad r^2 + 4$ | $0.005052160965172387 \quad r^2 + 4$ |
| $0.005456002972637555 \quad r^2 + 1$ | $0.005886047518226416 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.005456002972637555 \quad r^2 + 4$ | $0.005886047518226416 \quad r^2 + 4$ |
| $0.006343601214583815 \quad r^2 + 1$ | $0.006830015711407966 \quad r^2 + 1$ |
| -----,                               | -----,                               |
| $0.006343601214583815 \quad r^2 + 4$ | $0.006830015711407966 \quad r^2 + 4$ |

```

0.007346688477454374 r + 1 0.007895063574921807 r + 1
-----, -----,
2 2
0.007346688477454374 r + 4 0.007895063574921807 r + 4
2 2
0.008476632425691433 r + 1 0.009092934568891969 r + 1
-----, -----,
2 2
0.008476632425691433 r + 4 0.009092934568891969 r + 4
2 2
0.009745558409264787 r + 1 0.01043614195580549 r + 1
-----, -----,
2 2
0.009745558409264787 r + 4 0.01043614195580549 r + 4
2 2
0.01116637355015972 r + 1 0.01193799258425414 r + 1
-----, -----,
2 2
0.01116637355015972 r + 4 0.01193799258425414 r + 4
2 2
0.01275279020664547 r + 1 0.01361261001707348 r + 1
-----, -----,
2 2
0.01275279020664547 r + 4 0.01361261001707348 r + 4
2 2
0.01451934874870728 r + 1 0.01547495693757671 r + 1
-----, -----,
2 2
0.01451934874870728 r + 4 0.01547495693757671 r + 4
2 2
0.01648143957868493 r + 1 0.01754085676830185 r + 1
-----, -----,
2 2
0.01648143957868493 r + 4 0.01754085676830185 r + 4
2 2
0.01865532433194167 r + 1 0.01982701443753252 r + 1
-----, -----,
2 2
0.01865532433194167 r + 4 0.01982701443753252 r + 4
2 2
0.02105815619329058 r + 1 0.02235103622981523 r + 1
-----, -----,
2 2
0.02105815619329058 r + 4 0.02235103622981523 r + 4
2 2
0.02370799926592746 r + 1
-----]
2
0.02370799926592746 r + 4

```

```
>function p(x) &= x^3 - 2*x^2 + x + 1
```

```

3 2
[1, 4.629560185733296e-21 r - 5.5555000002996e-14 r
+ 1.66665833335744e-7 r + 1, 2.370228152344803e-18 r
- 3.555413336107812e-12 r + 1.33330666692022e-6 r + 1,
3 2
9.111269894211209e-17 r - 4.049635516010076e-11 r
+ 4.499797504338432e-6 r + 1, 1.213338392913399e-15 r
- 2.275191495098598e-10 r + 1.066581336583994e-5 r + 1,
3 2
9.038855153973427e-15 r - 8.678385681455278e-10 r
+ 2.083072932167196e-5 r + 1, 4.663081245331832e-14 r
- 2.591067043944349e-9 r + 3.599352055540239e-5 r + 1,
3 2
1.866849899228425e-13 r - 6.532853654188209e-9 r
+ 5.71526624672386e-5 r + 1, 6.207821288342913e-13 r
- 1.455423779101865e-8 r + 8.530603082730626e-5 r + 1,
3 2
1.791435437117283e-12 r - 2.950059460752145e-8 r
+ 1.214508019889565e-4 r + 1, 4.622690308385893e-12 r
- 5.550002710795514e-8 r + 1.665833531718508e-4 r + 1,
3 2
1.08966288698051e-11 r - 9.830103759477989e-8 r
+ 2.216991628251896e-4 r + 1, 2.383632899966278e-11 r
- 1.656492891022824e-7 r + 2.877927110806339e-4 r + 1,
3 2
4.89706040393017e-11 r - 2.67703245447488e-7 r
+ 3.658573803051457e-4 r + 1, 9.537218101552495e-11 r
- 4.174884566223164e-7 r + 4.568853557635201e-4 r + 1,
3 2
1.773788346113e-10 r - 6.313902344474573e-7 r
+ 5.618675264007778e-4 r + 1, 3.169263516001543e-10 r
- 9.29684441715876e-7 r + 6.817933857540259e-4 r + 1,
3 2

```

$$\begin{aligned}
& 5.466430236579597e-10 \, r - 1.337106096484567e-6 \, r^3 \\
& + 8.176509330039827e-4 \, r + 1, 9.138776205233783e-10 \, r^2 \\
& - 1.883455471733215e-6 \, r^3 + 9.704265741758145e-4 \, r + 1, \\
& 1.485856443052004e-9 \, r - 2.60424134931126e-6 \, r^2 \\
& + 0.001141105023499428 \, r + 1, 2.356190057011044e-9 \, r^3 \\
& - 3.541361065944888e-6 \, r^2 + 0.001330669204938795 \, r + 1, \\
& 3.652976621314145e-9 \, r^3 - 4.743816968088297e-6 \, r^2 \\
& + 0.001540100153900437 \, r + 1, 5.5487763042683e-9 \, r^3 \\
& - 6.268468871581265e-6 \, r^2 + 0.001770376919130678 \, r + 1, \\
& 8.272760081480085e-9 \, r^3 - 8.180822101433664e-6 \, r^2 \\
& + 0.002022476464811601 \, r + 1, 1.21253661802812e-8 \, r^3 \\
& - 1.055585066660079e-5 \, r^2 + 0.002297373572865413 \, r + 1, \\
& 1.749582852664251e-8 \, r^3 - 1.347885510435421e-5 \, r^2 \\
& + 0.002596040745477063 \, r + 1, 2.48829737081821e-8 \, r^3 \\
& - 1.704635450879823e-5 \, r^2 + 0.002919448107844891 \, r + 1, \\
& 3.491971613560118e-8 \, r^3 - 2.136701223823842e-5 \, r^2 \\
& + 0.003268563311168871 \, r + 1, 4.84017152072877e-8 \, r^3 \\
& - 2.656259477649252e-5 \, r^2 + 0.003644351435886262 \, r + 1, \\
& 6.632069329854989e-8 \, r^3 - 3.27689632038471e-5 \, r^2 \\
& + 0.004047774895164447 \, r + 1, 8.990294924675056e-8 \, r^3 \\
& - 4.013709671421296e-5 \, r^2 + 0.004479793338660443 \, r + 1, \\
& 1.206536386235075e-7 \, r^3 - 4.88341475961294e-5 \, r^2 \\
& + 0.0049413635565565 \, r + 1, 1.604074294104731e-7 \, r^3 \\
& - 5.904452707664529e-5 \, r^2 + 0.005433439383882244 \, r + 1, \\
& 2.113861796593763e-7 \, r^3 - 7.097102140868936e-5 \, r^2 \\
& + 0.005956971605131645 \, r + 1, 2.762643222525535e-7 \, r^3 \\
& - 8.483593756448373e-5 \, r^2 + 0.006512907859185624 \, r + 1, \\
& 3.582426809170893e-7 \, r^3 - 1.008822778796844e-4 \, r^2 \\
& + 0.007102192544548636 \, r + 1, 4.611314811139003e-7 \, r^3 \\
& - 1.193749429754545e-4 \, r^2 + 0.007725766724910044 \, r + 1, \\
& 5.894433592494652e-7 \, r^3 - 1.406019622683623e-4 \, r^2 \\
& + 0.00838456803503801 \, r + 1, 7.48497213770587e-7 \, r^3 \\
& - 1.648757513611664e-4 \, r^2 + 0.009079530587017326 \, r + 1, \\
& 9.445337820250508e-7 \, r^3 - 1.925343955908153e-4 \, r^2 \\
& + 0.009811584876838586 \, r + 1, 1.184843867230113e-6 \, r^3 \\
& - 2.23942958993792e-4 \, r^2 + 0.0105816576913495 \, r + 1, \\
& 1.47791018040781e-6 \, r^3 - 2.594948179329044e-4 \, r^2 \\
& + 0.01139067201557714 \, r + 1, 1.833563802644786e-6 \, r^3 \\
& - 2.996130186139707e-4 \, r^2 + 0.01223954694042984 \, r + 1, \\
& 2.263156313437196e-6 \, r^3 - 3.447516577056357e-4 \, r^2 \\
& + 0.01312919757078923 \, r + 1, 2.779748671107057e-6 \, r^3 \\
& - 3.953972852604938e-4 \, r^2 + 0.01406053493400045 \, r + 1, \\
& 3.398317971248571e-6 \, r^3 - 4.520703291211674e-4 \, r^2 \\
& + 0.01503446588876983 \, r + 1, 4.135983248800223e-6 \, r^3 \\
& - 5.153265399807901e-4 \, r^2 + 0.01605189303448024 \, r + 1, \\
& 5.012251528558996e-6 \, r^3 - 5.857584562533864e-4 \, r^2 \\
& + 0.01711371462093175 \, r + 1, 6.049285367679105e-6 \, r^3 \\
& - 6.639968878961927e-4 \, r^2 + 0.01822082445851714 \, r + 1, \\
& 7.27219317184779e-6 \, r^3 - 7.507124183129527e-4 \, r^2 \\
& + 0.01937411182884202 \, r + 1, 8.709343604319338e-6 \, r^3 \\
& - 8.466169234542863e-4 \, r^2 + 0.02057446139579705 \, r + 1, \\
& 1.039270544374422e-5 \, r^3 - 9.524651072191436e-4 \, r^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + 0.02182275311709253 \, r + 1, \, 1.235821428266067e-5 \, r^2 \\
& - 0.001069056052249234 \, r^3 + 0.02311986215626333 \, r + 1, \\
& 1.464616749355027e-5 \, r^2 - 0.001197234785196884 \, r^3 \\
& + 0.02446665879515308 \, r + 1, \, 1.730164892341175e-5 \, r^2 \\
& - 0.001337893855535677 \, r^3 + 0.02586400834688696 \, r + 1, \\
& 2.03749848107974e-5 \, r^2 - 0.001491974926972442 \, r^3 \\
& + 0.02731277106934082 \, r + 1, \, 2.392223245111114e-5 \, r^2 \\
& - 0.001660470380509015 \, r^3 + 0.02881380207911666 \, r + 1, \\
& 2.800570316659405e-5 \, r^2 - 0.001844424928192038 \, r^3 \\
& + 0.03036795126603076 \, r + 1, \, 3.269452116677009e-5 \, r^2 \\
& - 0.002044937236580204 \, r^3 + 0.03197606320812652 \, r + 1, \\
& 3.806521991306911e-5 \, r^2 - 0.002263161558948527 \, r^3 \\
& + 0.0336389770872163 \, r + 1, \, 4.420237762787336e-5 \, r^2 \\
& - 0.002500309375241576 \, r^3 + 0.03535752660496472 \, r + 1, \\
& 5.119929361320005e-5 \, r^2 - 0.002757651038778713 \, r^3 \\
& + 0.03713253989951881 \, r + 1, \, 5.915870706762558e-5 \, r^2 \\
& - 0.003036517428707191 \, r^3 + 0.03896483946269502 \, r + 1, \\
& 6.819356011175979e-5 \, r^2 - 0.003338301607191502 \, r^3 \\
& + 0.0408552420577305 \, r + 1, \, 7.842780675254545e-5 \, r^2 \\
& - 0.003664460480320846 \, r^3 + 0.04280455863760801 \, r + 1, \\
& 8.999726953478927e-5 \, r^2 - 0.004016516461709743 \, r^3 \\
& + 0.04481359426396048 \, r + 1, \, 1.030505456446138e-4 \, r^2 \\
& - 0.004396059137761843 \, r^3 + 0.04688314802656623 \, r + 1, \\
& 1.177499642437953e-4 \, r^2 - 0.004804746933560614 \, r^3 \\
& + 0.04901401296344043 \, r + 1, \, 1.342725968262571e-4 \, r^2 \\
& - 0.005244308778346301 \, r^3 + 0.05120697598153157 \, r + 1, \\
& 1.528113223981925e-4 \, r^2 - 0.00571654576953415 \, r^3 \\
& + 0.05346281777803219 \, r + 1, \, 1.735759492913189e-4 \, r^2 \\
& - 0.006223332834224134 \, r^3 + 0.05578231276230905 \, r + 1, \\
& 1.967943954246555e-4 \, r^2 - 0.006766620387150086 \, r^3 \\
& + 0.05816622897846346 \, r + 1, \, 2.227139288337551e-4 \, r^2 \\
& - 0.007348435984011858 \, r^3 + 0.06061532802852698 \, r + 1, \\
& 2.516024702876249e-4 \, r^2 - 0.007970885969132677 \, r^3 \\
& + 0.0631303649963022 \, r + 1, \, 2.837499598124257e-4 \, r^2 \\
& - 0.008636157116380975 \, r^3 + 0.06571208837185505 \, r + 1, \\
& 3.194697889375073e-4 \, r^2 - 0.009346518262294632 \, r^3 \\
& + 0.06836123997666599 \, r + 1, \, 3.591003004733362e-4 \, r^2 \\
& - 0.01010432193034477 \, r^3 + 0.07107855488944881 \, r + 1, \\
& 4.030063576223061e-4 \, r^2 - 0.01091200594527511 \, r^3 \\
& + 0.07386476137264342 \, r + 1, \, 4.51580984212316e-4 \, r^2 \\
& - 0.01177209503645283 \, r^3 + 0.07672058079958999 \, r + 1, \\
& 5.052470778292902e-4 \, r^2 - 0.01268720242916763 \, r^3 \\
& + 0.07964672758239233 \, r + 1, \, 5.644591976084321e-4 \, r^2 \\
& - 0.01366003142281593 \, r^3 + 0.08264390910047736 \, r + 1, \\
& 6.297054284249308e-4 \, r^2 - 0.01469337695490875 \, r^3 \\
& + 0.0857128256298576 \, r + 1, \, 7.015093232030855e-4 \, r^2 \\
& - 0.01579012714984361 \, r^3 + 0.08885417027310427 \, r + 1, \\
& 7.804319250382422e-4 \, r^2 - 0.01695326485138287 \, r^3 \\
& + 0.09206862889003742 \, r + 1, \, 8.670738707986594e-4 \, r^2 \\
& - 0.01818586913778394 \, r^3 + 0.09535688002914089 \, r + 1, \\
& 9.62077577844235e-4 \, r^2 - 0.01949111681852957 \, r^3 + 0.0987195948597075 \, r \\
& + 1, \, 0.001066129515466162 \, r^2 - 0.02087228391161097 \, r^3
\end{aligned}$$

```

+ 0.1021574371047232 r + 1, 0.001179962562615664 r
      2
- 0.02233274710031943 r + 0.1056710629744951 r + 1,
      3      2
0.001304358453451401 r - 0.02387598516850829 r
      3
+ 0.1092611211010309 r + 1, 0.001440150312193511 r
      2
- 0.02550558041329094 r + 0.1129282524731764 r + 1,
      3      2
0.001588225278727842 r - 0.02722522003414696 r
      3
+ 0.1166730903725168 r + 1, 0.001749527226356628 r
      2
- 0.02903869749741456 r + 0.1204962603100498 r + 1,
      3      2
0.001925059573041546 r - 0.03094991387515343 r
      3
+ 0.1243983799636342 r + 1, 0.00211588818743203 r
      2
- 0.03296287915736987 r + 0.1283800591162231 r + 1,
      3      2
0.002323144390915709 r - 0.0350817135366037 r + 0.1324418995948859 r
      3      2
+ 1, 0.002548028056868771 r - 0.03731064866388333 r
      3
+ 0.1365844952106265 r + 1, 0.002791810808222425 r
      2
- 0.03965402887506504 r + 0.140808431699002 r + 1,
      3      2
0.003055839314396869 r - 0.04211631238658116 r
      3
+ 0.1451142866615502 r + 1, 0.003341538688586619 r
      2
- 0.04470207245963047 r + 0.1495026295080298 r + 1,
      3      2
0.003650415986310767 r - 0.04741599853185493 r
+ 0.1539740213994798 r + 1]

```

```
>function t(x) &= sin(x)^2
```

```

      2      2
[0, sin (1.66665833335744e-7 r), sin (1.33330666692022e-6 r),
      2      2
sin (4.499797504338432e-6 r), sin (1.066581336583994e-5 r),
      2      2
sin (2.083072932167196e-5 r), sin (3.599352055540239e-5 r),
      2      2
sin (5.71526624672386e-5 r), sin (8.530603082730626e-5 r),
      2      2
sin (1.214508019889565e-4 r), sin (1.665833531718508e-4 r),
      2      2
sin (2.216991628251896e-4 r), sin (2.877927110806339e-4 r),
      2      2
sin (3.658573803051457e-4 r), sin (4.568853557635201e-4 r),
      2      2
sin (5.618675264007778e-4 r), sin (6.817933857540259e-4 r),
      2      2
sin (8.176509330039827e-4 r), sin (9.704265741758145e-4 r),
      2      2
sin (0.001141105023499428 r), sin (0.001330669204938795 r),
      2      2
sin (0.001540100153900437 r), sin (0.001770376919130678 r),
      2      2
sin (0.002022476464811601 r), sin (0.002297373572865413 r),
      2      2
sin (0.002596040745477063 r), sin (0.002919448107844891 r),
      2      2
sin (0.003268563311168871 r), sin (0.003644351435886262 r),
      2      2
sin (0.004047774895164447 r), sin (0.004479793338660443 r),
      2      2
sin (0.0049413635565565 r), sin (0.005433439383882244 r),
      2      2
sin (0.005956971605131645 r), sin (0.006512907859185624 r),
      2      2
sin (0.007102192544548636 r), sin (0.007725766724910044 r),
      2      2
sin (0.00838456803503801 r), sin (0.009079530587017326 r),
      2      2
sin (0.009811584876838586 r), sin (0.0105816576913495 r),
      2      2
sin (0.01139067201557714 r), sin (0.01223954694042984 r),
      2      2
sin (0.01312919757078923 r), sin (0.01406053493400045 r),
      2      2
sin (0.01503446588876983 r), sin (0.01605189303448024 r),
      2      2
sin (0.01711371462093175 r), sin (0.01822082445851714 r),
      2      2
sin (0.01937411182884202 r), sin (0.02057446139579705 r),
      2      2
sin (0.02182275311709253 r), sin (0.02311986215626333 r),
      2      2
sin (0.02446665879515308 r), sin (0.02586400834688696 r),
      2      2
sin (0.02731277106934082 r), sin (0.02881380207911666 r),
      2      2
sin (0.03036795126603076 r), sin (0.03197606320812652 r),
      2      2
sin (0.0336389770872163 r), sin (0.03535752660496472 r),

```

```

      2      2
sin (0.03713253989951881 r), sin (0.03896483946269502 r),
      2      2
sin (0.0408552420577305 r), sin (0.04280455863760801 r),
      2      2
sin (0.04481359426396048 r), sin (0.04688314802656623 r),
      2      2
sin (0.04901401296344043 r), sin (0.05120697598153157 r),
      2      2
sin (0.05346281777803219 r), sin (0.05578231276230905 r),
      2      2
sin (0.05816622897846346 r), sin (0.06061532802852698 r),
      2      2
sin (0.0631303649963022 r), sin (0.06571208837185505 r),
      2      2
sin (0.06836123997666599 r), sin (0.07107855488944881 r),
      2      2
sin (0.07386476137264342 r), sin (0.07672058079958999 r),
      2      2
sin (0.07964672758239233 r), sin (0.08264390910047736 r),
      2      2
sin (0.0857128256298576 r), sin (0.08885417027310427 r),
      2      2
sin (0.09206862889003742 r), sin (0.09535688002914089 r),
      2      2
sin (0.0987195948597075 r), sin (0.1021574371047232 r),
      2      2
sin (0.1056710629744951 r), sin (0.1092611211010309 r),
      2      2
sin (0.1129282524731764 r), sin (0.1166730903725168 r),
      2      2
sin (0.1204962603100498 r), sin (0.1243983799636342 r),
      2      2
sin (0.1283800591162231 r), sin (0.1324418995948859 r),
      2      2
sin (0.1365844952106265 r), sin (0.140808431699002 r),
      2      2
sin (0.1451142866615502 r), sin (0.1495026295080298 r),
      2      2
sin (0.1539740213994798 r)]

```

```
>function efunc(x) &= exp(-x^2)
```

```

      2      2
- 2.7777500001498e-14 r - 1.777706668053906e-12 r
[1, E , E
      2      2
- 2.024817758005038e-11 r - 1.137595747549299e-10 r
E , E
      2      2
- 4.339192840727639e-10 r - 1.295533521972174e-9 r
E , E
      2      2
- 3.266426827094104e-9 r - 7.277118895509326e-9 r
E , E
      2      2
- 1.475029730376073e-8 r - 2.775001355397757e-8 r
E , E
      2      2
- 4.915051879738995e-8 r - 8.28246445511412e-8 r
E , E
      2      2
- 1.33851622723744e-7 r - 2.087442283111582e-7 r
E , E
      2      2
- 3.156951172237287e-7 r - 4.64842220857938e-7 r
E , E
      2      2
- 6.685530482422835e-7 r - 9.417277358666075e-7 r
E , E
      2      2
- 1.30212067465563e-6 r - 1.770680532972444e-6 r
E , E
      2      2
- 2.371908484044149e-6 r - 3.134234435790633e-6 r
E , E
      2      2
- 4.090411050716832e-6 r - 5.277925333300395e-6 r
E , E
      2      2
- 6.739427552177103e-6 r - 8.523177254399114e-6 r
E , E
      2      2
- 1.068350611911921e-5 r - 1.328129738824626e-5 r
E , E
      2      2
- 1.638448160192355e-5 r - 2.006854835710647e-5 r
E , E
      2      2
- 2.44170737980647e-5 r - 2.952226353832265e-5 r
E , E
      2      2
- 3.548551070434468e-5 r - 4.241796878224187e-5 r
E , E
      2      2
- 5.044113893984222e-5 r - 5.968747148772726e-5 r
E , E
      2      2
- 7.030098113418114e-5 r - 8.243787568058321e-5 r
E , E
      2      2

```

```

- 9.626719779540763e-5 r - 1.11971479496896e-4 r
E , E
2 , 2
- 1.297474089664522e-4 r - 1.498065093069853e-4 r
E , E
2 , 2
- 1.723758288528179e-4 r - 1.976986426302469e-4 r
E , E
2 , 2
- 2.260351645605837e-4 r - 2.576632699903951e-4 r
E , E
2 , 2
- 2.928792281266932e-4 r - 3.319984439480964e-4 r
E , E
2 , 2
- 3.753562091564763e-4 r - 4.233084617271431e-4 r
E , E
2 , 2
- 4.762325536095718e-4 r - 5.34528026124617e-4 r
E , E
2 , 2
- 5.986173925984417e-4 r - 6.689469277678383e-4 r
E , E
2 , 2
- 7.459874634862211e-4 r - 8.302351902545073e-4 r
E , E
2 , 2
- 9.222124640960191e-4 r - 0.001022468618290102 r
E , E
2 , 2
- 0.001131580779474263 r - 0.001250154687620788 r
E , E
2 , 2
- 0.001378825519389357 r - 0.001518258714353595 r
E , E
2 , 2
- 0.001669150803595751 r - 0.001832230240160423 r
E , E
2 , 2
- 0.002008258230854871 r - 0.002198029568880921 r
E , E
2 , 2
- 0.002402373466780307 r - 0.002622154389173151 r
E , E
2 , 2
- 0.002858272884767075 r - 0.003111666417112067 r
E , E
2 , 2
- 0.003383310193575043 r - 0.003674217992005929 r
E , E
2 , 2
- 0.003985442984566339 r - 0.004318078558190487 r
E , E
2 , 2
- 0.004673259131147316 r - 0.005052160965172387 r
E , E
2 , 2
- 0.005456002972637555 r - 0.005886047518226416 r
E , E
2 , 2
- 0.006343601214583815 r - 0.006830015711407966 r
E , E
2 , 2
- 0.007346688477454374 r - 0.007895063574921807 r
E , E
2 , 2
- 0.008476632425691433 r - 0.009092934568891969 r
E , E
2 , 2
- 0.009745558409264787 r - 0.01043614195580549 r
E , E
2 , 2
- 0.01116637355015972 r - 0.01193799258425414 r
E , E
2 , 2
- 0.01275279020664547 r - 0.01361261001707348 r
E , E
2 , 2
- 0.01451934874870728 r - 0.01547495693757671 r
E , E
2 , 2
- 0.01648143957868493 r - 0.01754085676830185 r
E , E
2 , 2
- 0.01865532433194167 r - 0.01982701443753252 r
E , E
2 , 2
- 0.02105815619329058 r - 0.02235103622981523 r
E , E
2 , 2
- 0.02370799926592746 r
E ]

```

```
>function F(x,y) &= x*y^2
```

```

3 3
[0, 4.16657638981961e-16 r , 5.332871129903807e-14 r ,
3 3
9.110723225048472e-13 r , 6.824300473743681e-12 r ,
3 3
3.253445543490285e-11 r , 1.165490540847616e-10 r ,

```

```

3
3
3.427787946646746e-10 r , 8.726024334527793e-10 r ,
3
3
1.989409082144706e-9 r , 4.157648059636649e-9 r ,
3
3
8.098393717284195e-9 r , 1.488340676994484e-8 r ,
3
3
2.604964463523586e-8 r , 4.373614114290166e-8 r ,
3
3
7.08451407610811e-8 r , 1.112293342359498e-7 r ,
3
3
1.699070012987613e-7 r , 2.533068219057486e-7 r ,
3
3
3.695440703916023e-7 r , 5.287298569888762e-7 r ,
3
3
7.433150284501752e-7 r , 1.028470284066223e-6 r ,
3
3
1.402504005263817e-6 r , 1.887319236258253e-6 r ,
3
3
2.508911189994038e-6 r , 3.2979065879063e-6 r ,
3
3
4.290146073948239e-6 r , 5.527310872933712e-6 r ,
3
3
7.057594790618794e-6 r , 8.936422578174055e-6 r ,
3
3
1.122721560686316e-5 r , 1.400220571993862e-5 r ,
3
3
1.734329804806516e-5 r , 2.134298349210086e-5 r ,
3
3
2.610530149287412e-5 r , 3.174685362181254e-5 r ,
3
3
3.839786843897777e-5 r , 4.620331797637646e-5 r ,
3
3
5.532408611440168e-5 r , 6.593818902807768e-5 r ,
3
3
7.824204778747691e-5 r , 9.245181310340418e-5 r ,
3
3
1.088047421152915e-4 r , 1.275606270233113e-4 r ,
3
3
1.490032752711322e-4 r , 1.734420408896224e-4 r ,
3
3
2.012134065152227e-4 r , 2.326826154998178e-4 r ,
3
3
2.682453534318728e-4 r , 3.083294782913629e-4 r ,
3
3
3.533967983639043e-4 r , 4.039448969424265e-4 r ,
3
3
4.60509002747975e-4 r , 5.23663904904824e-4 r ,
3
3
5.940259112091331e-4 r , 6.722548483350995e-4 r ,
3
3
7.590561025278945e-4 r , 8.551826992389808e-4 r ,
3
3
9.614374200664624e-4 r , 0.001078674955271478 r ,
3
3
0.001207804090050937 r , 0.001349789922657663 r ,
3
3
0.001505656112371037 r , 0.001676487155234893 r ,
3
3
0.001863430685394525 r , 0.002067699799781727 r ,
3
3
0.002290575403815426 r , 0.002533408575706231 r ,
3
3
0.002797622946876039 r , 0.003084717095928466 r ,
3
3
0.003396266953533375 r , 0.003733928215517844 r ,
3
3
0.004099438761388154 r , 0.004494621075441547 r ,
3
3
0.004921384667563697 r , 0.005381728490747605 r ,
3
3
0.005877743352312116 r , 0.006411614315743688 r ,
3
3
0.006985623090033568 r , 0.007602150403333847 r ,
3
3
0.008263678357710484 r , 0.008972792761729152 r ,
3
3
0.009732185437570753 r , 0.01054465649933785 r ,
3
3
0.01141311659918089 r , 0.01234058913784444 r ,
3
3
0.01333021243620828 r , 0.01438524186437641 r ,
3
3
0.01550905192484908 r , 0.01670513828629834 r ,
3
3
0.01797711976445708 r , 0.01932874024662426 r ,
3
3
0.02076387055628594 r , 0.02228651025435286 r ,
3
3
0.02390078937351852 r , 0.02561097008225158 r ,
3
3
0.02742144827494749 r , 0.02933675508478104 r ,
3
3
0.03136155831582115 r ]

```

## Barisan dan Deret

(Catatan: bagian ini belum lengkap. Anda dapat membaca contoh-contoh penggunaan EMT dan Maxima untuk menghitung limit barisan, rumus jumlah parsial suatu deret, jumlah tak hingga suatu deret konvergen, dan sebagainya. Anda dapat mengeksplor contoh-contoh di EMT atau berbagai panduan penggunaan Maxima di software Maxima atau dari Internet.)

Barisan dapat didefinisikan dengan beberapa cara di dalam EMT, di antaranya:

- dengan cara yang sama seperti mendefinisikan vektor dengan elemen-elemen beraturan (menggunakan titik dua ":");
- menggunakan perintah "sequence" dan rumus barisan (suku ke -n);
- menggunakan perintah "iterate" atau "niterate";
- menggunakan fungsi Maxima "create\_list" atau "makelist" untuk menghasilkan barisan simbolik;
- menggunakan fungsi biasa yang inputnya vektor atau barisan;
- menggunakan fungsi rekursif.

EMT menyediakan beberapa perintah (fungsi) terkait barisan, yakni:

- sum: menghitung jumlah semua elemen suatu barisan
- cumsum: jumlah kumulatif suatu barisan
- differences: selisih antar elemen-elemen berturutan

EMT juga dapat digunakan untuk menghitung jumlah deret berhingga maupun deret tak hingga, dengan menggunakan perintah (fungsi) "sum". Perhitungan dapat dilakukan secara numerik maupun simbolik dan eksak.

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan barisan dan deret menggunakan EMT.

```
>1:10 // barisan sederhana
```

```
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
```

```
>1:2:30
```

```
[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29]
```

## Iterasi dan Barisan

EMT menyediakan fungsi `iterate("g(x)", x0, n)` untuk melakukan iterasi

$$x_{k+1} = g(x_k), x_0 = x_0, k = 1, 2, 3, \dots, n.$$

Berikut ini disajikan contoh-contoh penggunaan iterasi dan rekursi dengan EMT. Contoh pertama menunjukkan pertumbuhan dari nilai awal 1000 dengan laju pertumbuhan 5%, selama 10 periode.

```
>q=1.05; iterate("x*q",1000,n=10)'
```

```
1000
1050
1102.5
1157.63
1215.51
1276.28
1340.1
1407.1
1477.46
1551.33
1628.89
```

Contoh berikutnya memperlihatkan bahaya menabung di bank pada masa sekarang! Dengan bunga tabungan sebesar 6% per tahun atau 0.5% per bulan dipotong pajak 20%, dan biaya administrasi 10000 per bulan, tabungan sebesar 1 juta tanpa diambil selama sekitar 10 tahunan akan habis diambil oleh bank!

```
>r=0.005; plot2d(iterate("(1+0.8*r)*x-10000",1000000,n=130)):
```

Silakan Anda coba-coba, dengan tabungan minimal berapa agar tidak akan habis diambil oleh bank dengan ketentuan bunga dan biaya administrasi seperti di atas.

Berikut adalah perhitungan minimal tabungan agar aman di bank dengan bunga sebesar  $r$  dan biaya administrasi  $a$ , pajak bunga 20%.

```
>$solve(0.8*r*A-a,A), $% with [r=0.005, a=10]
```

Berikut didefinisikan fungsi untuk menghitung saldo tabungan, kemudian dilakukan iterasi.

```
>function saldo(x,r,a) := round((1+0.8*r)*x-a,2);
>iterate({"saldo",0.005,10}),1000,n=6)
```

```
[1000, 994, 987.98, 981.93, 975.86, 969.76, 963.64]
```

```
>iterate({"saldo",0.005,10}),2000,n=6)
```

```
[2000, 1998, 1995.99, 1993.97, 1991.95, 1989.92, 1987.88]
```

```
>iterate({{"saldo",0.005,10}},2500,n=6)
```

```
[2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500]
```

Tabungan senilai 2,5 juta akan aman dan tidak akan berubah nilai (jika tidak ada penarikan), sedangkan jika tabungan awal kurang dari 2,5 juta, lama kelamaan akan berkurang meskipun tidak pernah dilakukan penarikan uang tabungan.

```
>iterate({{"saldo",0.005,10}},3000,n=6)
```

```
[3000, 3002, 3004.01, 3006.03, 3008.05, 3010.08, 3012.12]
```

Tabungan yang lebih dari 2,5 juta baru akan bertambah jika tidak ada penarikan.

Untuk barisan yang lebih kompleks dapat digunakan fungsi "sequence()". Fungsi ini menghitung nilai-nilai  $x[n]$  dari semua nilai sebelumnya,  $x[1], \dots, x[n-1]$  yang diketahui. Berikut adalah contoh barisan Fibonacci.

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2}, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 1$$

```
>sequence("x[n-1]+x[n-2]", [1,1],15)
```

```
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610]
```

Barisan Fibonacci memiliki banyak sifat menarik, salah satunya adalah akar pangkat ke-n suku ke-n akan konvergen ke pecahan emas:

```
>$'(1+sqrt(5))/2=float((1+sqrt(5))/2)
>plot2d(sequence("x[n-1]+x[n-2]", [1,1],250)^(1/(1:250))):
```

Barisan yang sama juga dapat dihasilkan dengan menggunakan loop.

```
>x=ones(500); for k=3 to 500; x[k]=x[k-1]+x[k-2]; end;
```

Rekursi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang tergantung pada semua elemen sebelumnya. Pada contoh berikut, elemen ke-n merupakan jumlah (n-1) elemen sebelumnya, dimulai dengan 1 (elemen ke-1). Jelas, nilai elemen ke-n adalah  $2^{(n-2)}$ , untuk  $n=2, 4, 5, \dots$

```
>sequence("sum(x)",1,10)
```

```
[1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256]
```

Selain menggunakan ekspresi dalam  $x$  dan  $n$ , kita juga dapat menggunakan fungsi.

Pada contoh berikut, digunakan iterasi

$$x_n = A \cdot x_{n-1},$$

dengan  $A$  suatu matriks  $2 \times 2$ , dan setiap  $x[n]$  merupakan matriks/vektor  $2 \times 1$ .

```
>A=[1,1;1,2]; function suku(x,n) := A.x[,n-1]
>sequence("suku", [1;1],6)
```

Real 2 x 6 matrix

```
      1      2      5      13      ...
      1      3      8      21      ...
```

Hasil yang sama juga dapat diperoleh dengan menggunakan fungsi perpangkatan matriks "matrixpower()". Cara ini lebih cepat, karena hanya menggunakan perkalian matriks sebanyak  $\log_2(n)$ .

$$x_n = A \cdot x_{n-1} = A^2 \cdot x_{n-2} = A^3 \cdot x_{n-3} = \dots = A^{n-1} \cdot x_1.$$

```
>sequence("matrixpower(A,n) . [1;1]",1,6)
```

Real 2 x 6 matrix

|   |   |    |    |     |
|---|---|----|----|-----|
| 1 | 5 | 13 | 34 | ... |
| 1 | 8 | 21 | 55 | ... |

## Spiral Theodorus

image: Spiral\_of\_Theodorus.png

Spiral Theodorus (spiral segitiga siku-siku) dapat digambar secara rekursif. Rumus rekursifnya adalah:

$$x_n = \left(1 + \frac{i}{\sqrt{n-1}}\right) x_{n-1}, \quad x_1 = 1,$$

yang menghasilkan barisan bilangan kompleks.

```
>function g(n) := 1+I/sqrt(n)
```

Rekursinya dapat dijalankan sebanyak 17 untuk menghasilkan barisan 17 bilangan kompleks, kemudian digambar bilangan-bilangan kompleksnya.

```
>x=sequence("g(n-1)*x[n-1]",1,17); plot2d(x,r=3.5); textbox(latex("Spiral\ Theodorus"),0.4):
```

Selanjutnya dihubungkan titik 0 dengan titik-titik kompleks tersebut menggunakan loop.

```
>for i=1:cols(x); plot2d([0,x[i]],>add); end:
>
```

Spiral tersebut juga dapat didefinisikan menggunakan fungsi rekursif, yang tidak memerlukan indeks dan bilangan kompleks. Dalam hal ini digunakan vektor kolom pada bidang.

```
>function gstep (v) ...
w=[-v[2];v[1]];
return v+w/norm(w);
endfunction
```

Jika dilakukan iterasi 16 kali dimulai dari [1;0] akan didapatkan matriks yang memuat vektor-vektor dari setiap iterasi.

```
>x=iterate("gstep",[1;0],16); plot2d(x[1],x[2],r=3.5,>points):
```

## Kekonvergenan

Terkadang kita ingin melakukan iterasi sampai konvergen. Apabila iterasinya tidak konvergen setelah ditunggu lama, Anda dapat menghentikannya dengan menekan tombol [ESC].

```
>iterate("cos(x)",1) // iterasi x(n+1)=cos(x(n)), dengan x(0)=1.
```

```
0.739085133216
```

Iterasi tersebut konvergen ke penyelesaian persamaan

$$x = \cos(x).$$

Iterasi ini juga dapat dilakukan pada interval, hasilnya adalah barisan interval yang memuat akar tersebut.

```
>hasil := iterate("cos(x)",~1,2~) //iterasi x(n+1)=cos(x(n)), dengan interval awal (1, 2)
```

```
~0.739085133211,0.7390851332133~
```

Jika interval hasil tersebut sedikit diperlebar, akan terlihat bahwa interval tersebut memuat akar persamaan  $x=\cos(x)$ .

```
>h=expand(hasil,100), cos(h) << h
```

```
~0.73908513309,0.73908513333~
1
```

Iterasi juga dapat digunakan pada fungsi yang didefinisikan.

```
>function f(x) := (x+2/x)/2
```

Iterasi  $x(n+1)=f(x(n))$  akan konvergen ke akar kuadrat 2.

```
>iterate("f",2), sqrt(2)
```

```
1.41421356237
1.41421356237
```

Jika pada perintah `iterate` diberikan tambahan parameter `n`, maka hasil iterasinya akan ditampilkan mulai dari iterasi pertama sampai ke-`n`.

```
>iterate("f",2,5)
```

```
[2, 1.5, 1.41667, 1.41422, 1.41421, 1.41421]
```

Untuk iterasi ini tidak dapat dilakukan terhadap interval.

```
>niterate("f",~1,2~,5)
```

```
[ ~1,2~, ~1,2~, ~1,2~, ~1,2~, ~1,2~, ~1,2~ ]
```

Perhatikan, hasil iterasinya sama dengan interval awal. Alasannya adalah perhitungan dengan interval bersifat terlalu longgar. Untuk meingkatkan perhitungan pada ekspresi dapat digunakan pembagian intervalnya, menggunakan fungsi `ieval()`.

```
>function s(x) := ieval("(x+2/x)/2",x,10)
```

Selanjutnya dapat dilakukan iterasi hingga diperoleh hasil optimal, dan intervalnya tidak semakin mengecil. Hasilnya berupa interval yang memuat akar persamaan:

$$x = \frac{1}{2} \left( x + \frac{2}{x} \right).$$

Satu-satunya solusi adalah

$$x = \sqrt{2}.$$

```
>iterate("s",~1,2~)
```

```
~1.41421356236,1.41421356239~
```

Fungsi `"iterate()"` juga dapat bekerja pada vektor. Berikut adalah contoh fungsi vektor, yang menghasilkan rata-rata aritmetika dan rata-rata geometri.

$$(a_{n+1}, b_{n+1}) = \left( \frac{a_n + b_n}{2}, \sqrt{a_n b_n} \right)$$

Iterasi ke-`n` disimpan pada vektor kolom `x[n]`.

```
>function g(x) := [(x[1]+x[2])/2;sqrt(x[1]*x[2])]
```

Iterasi dengan menggunakan fungsi tersebut akan konvergen ke rata-rata aritmetika dan geometri dari nilai-nilai awal.

```
>iterate("g",[1;5])
```

```
2.60401
2.60401
```

Hasil tersebut konvergen agak cepat, seperti kita cek sebagai berikut.

```
>iterate("g",[1;5],4)
```

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 3       | 2.61803 | 2.60403 | 2.60401 |
| 5 | 2.23607 | 2.59002 | 2.60399 | 2.60401 |

Iterasi pada interval dapat dilakukan dan stabil, namun tidak menunjukkan bahwa limitnya pada batas-batas yang dihitung.

```
>iterate("g",[~1~;~5~],4)
```

```
Interval 2 x 5 matrix
```

```
~0.999999999999999778,1.00000000000000022~    ...
~4.99999999999999911,5.00000000000000089~    ...
```

Iterasi berikut konvergen sangat lambat.

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n}.$$

```
>iterate("sqrt(x)",2,10)
```

```
[2, 1.41421, 1.18921, 1.09051, 1.04427, 1.0219, 1.01089,
1.00543, 1.00271, 1.00135, 1.00068]
```

Kekonvergenan iterasi tersebut dapat dipercepat dengan percepatan Steffenson:

```
>steffenson("sqrt(x)",2,10)
```

```
[1.04888, 1.00028, 1, 1]
```

## Iterasi menggunakan Loop yang ditulis Langsung

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan loop untuk melakukan iterasi yang ditulis langsung pada baris perintah.

```
>x=2; repeat x=(x+2/x)/2; until x^2~2; end; x,
```

```
1.41421356237
```

Penggabungan matriks menggunakan tanda "|" dapat digunakan untuk menyimpan semua hasil iterasi.

```
>v=[1]; for i=2 to 8; v=v|(v[i-1]*i); end; v,
```

```
[1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320]
```

hasil iterasi juga dapat disimpan pada vektor yang sudah ada.

```
>v=ones(1,100); for i=2 to cols(v); v[i]=v[i-1]*i; end; ...
plot2d(v,logplot=1); textbox(latex(&log(n)),x=0.5):
>A=[0.5,0.2;0.7,0.1]; b=[2;2]; ...
x=[1;1]; repeat xnew=A.x-b; until all(xnew~x); x=xnew; end; ...
x,
```

```
-7.09677
-7.74194
```

## Iterasi di dalam Fungsi

Fungsi atau program juga dapat menggunakan iterasi dan dapat digunakan untuk melakukan iterasi. Berikut iterasi di dalam fungsi.

Contoh berikut adalah suatu fungsi untuk menghitung berapa lama suatu iterasi konvergen. Nilai fungsi te iterasi dan banyak iterasi sampai konvergen.

```
>function map hiter(f$,x0) ...
x=x0;
maxiter=0;
repeat
xnew=f$(x);
maxiter=maxiter+1;
until xnew~x;
x=xnew;
end;
return maxiter;
endfunction
```

Misalnya, berikut adalah iterasi untuk mendapatkan hampiran akar kuadrat 2, cukup cepat, konvergen pada iterasi ke-5, jika dimulai dari hampiran awal 2.

```
>hiter("(x+2/x)/2",2)
```

5

Karena fungsinya didefinisikan menggunakan "map". maka nilai awalnya dapat berupa vektor.

```
>x=1.5:0.1:10; hasil=hiter("(x+2/x)/2",x); ...
plot2d(x,hasil):
```

Dari gambar di atas terlihat bahwa kekonvergenan iterasinya semakin lambat, untuk nilai awal semakin besar, namun penambahannya tidak kontinu. Kita dapat menemukan kapan maksimum iterasinya bertambah.

```
>hasil[1:10]
```

```
[4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6]
```

```
>x[nonzeros(differences(hasil))]
```

```
[1.5, 2, 3.4, 6.6]
```

maksimum iterasi sampai konvergen meningkat pada saat nilai awalnya 1.5, 2, 3.4, dan 6.6.

Contoh berikutnya adalah metode Newton pada polinomial kompleks berderajat 3.

```
>p &= x^3-1; newton &= x-p/diff(p,x); $newton
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);
```

```
Error in:
p &= x^3-1; newton &= x-p/diff(p,x); $newton ...
^
```

Selanjutnya didefinisikan fungsi untuk melakukan iterasi (aslinya 10 kali).

```
>function iterasi(f$,x,n=10) ...
loop 1 to n; x=f$(x); end;
return x;
endfunction
```

Kita mulai dengan menentukan titik-titik grid pada bidang kompleksnya.

```
>r=1.5; x=linspace(-r,r,501); Z=x+I*x'; W=iterasi(newton,Z);
```

```
Function newton needs at least 3 arguments!
Use: newton (f$: call, df$: call, x: scalar complex {, y: number, eps: none})
Error in:
... x=linspace(-r,r,501); Z=x+I*x'; W=iterasi(newton,Z); ...
^
```

Berikut adalah akar-akar polinomial di atas.

```
>z=&solve(p)()
```

```
Maxima said:
solve: more equations than unknowns.
Unknowns given :
[r]
Equations given:
errexp1
-- an error. To debug this try: debugmode(true);
```

```
Error in:
z=&solve(p)() ...
^
```

Untuk menggambar hasil iterasinya, dihitung jarak dari hasil iterasi ke-10 ke masing-masing akar, kemudian digunakan untuk menghitung warna yang akan digambar, yang menunjukkan limit untuk masing-masing nilai awal.

Fungsi plotrgb() menggunakan jendela gambar terkini untuk menggambar warna RGB sebagai matriks.

```
>C=rgb(max(abs(W-z[1]),1),max(abs(W-z[2]),1),max(abs(W-z[3]),1)); ...
plot2d(none,-r,r,-r,r); plotrgb(C):
```

```
Variable W not found!
Error in:
```

```
C=rgb(max(abs(W-z[1]),1),max(abs(W-z[2]),1),max(abs(W-z[3]),1)) ...
```

## Iterasi Simbolik

Seperti sudah dibahas sebelumnya, untuk menghasilkan barisan ekspresi simbolik dengan Maxima dapat digunakan fungsi makelist().

```
>&powerdisp:true // untuk menampilkan deret pangkat mulai dari suku berpangkat terkecil
```

```
true
```

```
>deret &= makelist(taylor(exp(x),x,0,k),k,1,3); $deret // barisan deret Taylor untuk e^x
```

```
Maxima said:
taylor: 0.1539740213994798*r cannot be a variable.
-- an error. To debug this try: debugmode(true);
```

```
Error in:
deret &= makelist(taylor(exp(x),x,0,k),k,1,3); $deret // baris ...
```

Untuk mengubah barisan deret tersebut menjadi vektor string di EMT digunakan fungsi mxm2str(). Selanjutnya, vektor string/ekspresi hasilnya dapat digambar seperti menggambar vektor ekspresi pada EMT.

```
>plot2d("exp(x)",0,3); // plot fungsi aslinya, e^x
>plot2d(mxm2str("deret"),>add,color=4:6): // plot ketiga deret taylor hampiran fungsi tersebut
```

```
Maxima said:
length: argument cannot be a symbol; found deret
-- an error. To debug this try: debugmode(true);
```

```
mxmeval:
return evaluate(mxm(s));
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
mxm2str:
n=mxmeval("length(VVV)");
```

Selain cara di atas dapat juga dengan cara menggunakan indeks pada vektor/list yang dihasilkan.

```
>$deret[3]
>plot2d(["exp(x)",&deret[1],&deret[2],&deret[3]],0,3,color=1:4):
```

```
deret is not a variable!
Error in expression: deret[1]
%ploteval:
y0=f$(x[1],args());
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
plot2d:
u=u_(%ploteval(xx[#],t,args()));
```

```
>$sum(sin(k*x)/k,k,1,5)
```

Berikut adalah cara menggambar kurva

$$y = \sin(x) + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \dots$$

```
>plot2d(&sum(sin((2*k+1)*x)/(2*k+1),k,0,20),0,2pi):
```

```
Maxima output too long!
Error in:
plot2d(&sum(sin((2*k+1)*x)/(2*k+1),k,0,20),0,2pi): ...
```

Hal serupa juga dapat dilakukan dengan menggunakan matriks, misalkan kita akan menggambar kurva

$$y = \sum_{k=1}^{100} \frac{\sin(kx)}{k}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi.$$

```
>x=linspace(0,2pi,1000); k=1:100; y=sum(sin(k*x')/k)'; plot2d(x,y):
```

## Tabel Fungsi

Terdapat cara menarik untuk menghasilkan barisan dengan ekspresi Maxima. Perintah `mxmtable()` berguna untuk menampilkan dan menggambar barisan dan menghasilkan barisan sebagai vektor kolom.

Sebagai contoh berikut adalah barisan turunan ke- $n$   $x^x$  di  $x=1$ .

```
>mxmtable("diffat(x^x,x=1,n)","n",1,8,frac=1);
```

```
Maxima said:
diff: second argument must be a variable; found errexp1
#0: diffat(expr=[0,1.66665833335744e-7*r,1.33330666692022e-6*r,4.499797504338432e-6*r,1.066581336583994e-5
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

%mxmevtable:
return mxm("@expr,@var=@value")();
Try "trace errors" to inspect local variables after errors.
mxmtable:
y[#,1]=%mxmevtable(expr,var,x[#]);
```

```
>$'sum(k, k, 1, n) = factor(ev(sum(k, k, 1, n),simpsum=true)) // simpsum:menghitung deret secara simbolik
>$'sum(1/(3^k+k), k, 0, inf) = factor(ev(sum(1/(3^k+k), k, 0, inf),simpsum=true))
```

Di sini masih gagal, hasilnya tidak dihitung.

```
>$'sum(1/x^2, x, 1, inf)= ev(sum(1/x^2, x, 1, inf),simpsum=true) // ev: menghitung nilai ekspresi
>$'sum((-1)^(k-1)/k, k, 1, inf) = factor(ev(sum((-1)^(x-1)/x, x, 1, inf),simpsum=true))
```

Di sini masih gagal, hasilnya tidak dihitung.

```
>$'sum((-1)^k/(2*k-1), k, 1, inf) = factor(ev(sum((-1)^k/(2*k-1), k, 1, inf),simpsum=true))
>$ev(sum(1/n!, n, 0, inf),simpsum=true)
```

Di sini masih gagal, hasilnya tidak dihitung, harusnya hasilnya e.

```
>&assume(abs(x)<1); $'sum(a*x^k, k, 0, inf)=ev(sum(a*x^k, k, 0, inf),simpsum=true), &forget(abs(x)<1);
```

```
Answering "Is -94914474571+15819*r positive, negative or zero?" with "positive"
Maxima said:
sum: sum is divergent.
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
... k, 0, inf)=ev(sum(a*x^k, k, 0, inf),simpsum=true), &forget(abs ...
^
```

Deret geometri tak hingga, dengan asumsi rasional antara -1 dan 1.

```
>$'sum(x^k/k!,k,0,inf)=ev(sum(x^k/k!,k,0,inf),simpsum=true)
>$limit(sum(x^k/k!,k,0,n),n,inf)
>function d(n) &= sum(1/(k^2-k),k,2,n); $'d(n)=d(n)
>$d(10)=ev(d(10),simpsum=true)
>$d(100)=ev(d(100),simpsum=true)
```

## Deret Taylor

Deret Taylor suatu fungsi  $f$  yang diferensiabel sampai tak hingga di sekitar  $x=a$  adalah:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-a)^k f^{(k)}(a)}{k!}.$$

```
>$'e^x =taylor(exp(x),x,0,10) // deret Taylor e^x di sekitar x=0, sampai suku ke-11
```

```
Maxima said:
taylor: 0.1539740213994798*r cannot be a variable.
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
$'e^x =taylor(exp(x),x,0,10)
^
deret Taylor e^x di sekitar x= ...
```

```
>$'log(x)=taylor(log(x),x,1,10)// deret log(x) di sekitar x=1
```

```
Maxima said:
log: encountered log(0).
-- an error. To debug this try: debugmode(true);

Error in:
$'log(x)=taylor(log(x),x,1,10)
^
deret log(x) di sekitar x=1 ...
```

