

## Actividad con Geogebra

### Geogebra actividad - Relacionar una función con su primera y su segunda derivada

#### Descripción de la actividad

Vamos a estudiar la relación entre las gráficas de una función y las gráficas de sus dos primeras derivadas.

Recordamos que la derivada es una medida del crecimiento o decrecimiento de una función. Si la derivada es positiva en un punto, significa que la función es creciente. Si la derivada es negativa, significa que la función es decreciente. Y si la derivada es nula, significa que puede hacer un extremo relativo:

$$f'(x) = 0$$

Además, los puntos de inflexión son los extremos de la primera derivada. Es decir, si derivamos la primera derivada e igualamos a cero, obtenemos la condición necesaria de punto de inflexión:  $f''(x) = 0$ .

Además, la interpretación geométrica de la derivada nos dice que la derivada de una función en un punto  $x_0$  coincide con la pendiente de la recta tangente en ese punto:  $m = f'(x_0)$ .


Vamos a relacionar la gráfica de  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  con la gráfica de sus funciones derivadas.

#### Paso 1

En la Vista Gráfica dibujamos  $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$  y sus dos primeras derivadas. A la primera derivada la llamamos  $g(x) = f'(x)$  y a la segunda derivada  $h(f'(x))$ . En la línea de entrada escribimos:

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2} \quad g(x) = \text{Derivada}(f) \quad h(x) = \text{Derivada}(g)$$

Imagen 1. Detalle de las tres funciones representadas en Vista Gráfica



## Paso 2

Activamos la vista CAS de Geogebra. El comando Soluciones permite resolver una ecuación. Para obtener los puntos críticos escribimos en CAS lo siguiente:

$$\text{puntoCritico} := \text{Soluciones}(g(x)=0)$$

En la variable puntoCritico estamos resolviendo la ecuación que resulta de igualar  $g(x)$  a cero. Es decir, de igualar la primera derivada a cero. Con esto obtenemos los puntos críticos.

El comando Soluciones devuelve una lista con tanto elementos como soluciones tenga la ecuación. En nuestro caso, solo tenemos una solución: 0.

Para poder trabajar con el valor de la solución, debemos seleccionar el primer elemento de la lista. Así, podremos representar la coordenada horizontal y vertical del punto crítico con el siguiente comando:

$$A := (\text{puntoCritico}(1), f(\text{puntoCritico}(1)))$$

De esta forma tendremos el punto  $A(0,1)$ , que podremos pintar en Vista Gráfica pulsando sobre el icono circular de la línea de CAS.


Vamos a trazar la recta tangente a  $f(x)$  que pase por el punto crítico. Como es un máximo relativo, tendremos una recta horizontal (pendiente cero). Para obtener la recta tangente usamos el comando de Geogebra llamado Tangente:

$$\text{recta}_A := \text{Tangente}(\text{puntoCritico}, f)$$

Recuerda que el subíndice se escribe con la tecla de guión bajo.

Mostramos también la recta tangente en la Vista Gráfica

Imagen 2. Comandos en CAS para obtener punto crítico y recta tangente a la función



## Paso 3

Sabemos que los puntos de inflexión cumplen la condición  $f''(x)=0$ . Es decir, los puntos de inflexión son los extremos relativos de la función primera derivada. Vamos a comprobarlo con Geogebra.

Vamos a repetir los pasos del Paso anterior, pero ahora trabajando con  $g(x)$  (que es la primera derivada de  $f(x)$ ).

$$\text{puntoCriticoG} := \text{Soluciones}(h(x)=0)$$

Ahora tendremos almacenada en la variable puntoCriticoG una lista de dos elementos, que son los dos valores que anulan a la segunda derivada.

Podemos obtener las coordenadas horizontales y verticales de los puntos críticos con las siguientes instrucciones:

$$B := (\text{puntoCriticoG}(1), f(\text{puntoCriticoG}(1)))$$


$$C := (\text{puntoCriticoG}(2), f(\text{puntoCriticoG}(2)))$$

Vamos a comprobar que los puntos de inflexión son los extremos relativos de la primera derivada. Para ello dibujamos las rectas tangentes a la función  $g(x)$  que pasan por los puntos  $B$  y  $C$ .

$$\text{recta}_B := \text{Tangente}(\text{puntoCriticoG}(1), g)$$

$$\text{recta}_C := \text{Tangente}(\text{puntoCriticoG}(2), g)$$

Imagen 3. Comandos en CAS para obtener los puntos de inflexión de la función y las rectas tangentes a la función derivada



## Paso 4

Finalmente vamos a crear unos botones sobre la Vista Gráfica para poder mostrar toda la información obtenida paso a paso.


Primero creamos una casilla de control que permita mostrar la función de partida. Pulsamos en  y en el rótulo escribimos “Dibujar f(x)”. Del menú desplegable elegimos la función.

Repetimos el mismo procedimiento para crear otras seis casillas de control:

- Obtener punto crítico:  $f'(x)=0$
- Obtener recta tangente que pase por el punto crítico (pendiente nula)
- Dibujar  $f'(x)$
- Obtener puntos de inflexión:  $f''(x)=0$

- Obtener recta tangente a la derivada que pasa por los puntos de inflexión (pendiente nula)
- Dibujar  $f''(x)$

Imagen 4. Casillas de control



Para terminar, **debes escribir en tu cuaderno el siguiente párrafo (resumen de la teoría de la actividad):**

*“La función derivada está relacionada con la monotonía de la función original.*

*Una derivada positiva, implica función creciente. Una derivada negativa, función decreciente. Una derivada igual a cero es la condición necesaria de extremo relativo:  $f'(x)=0$ .*

*La segunda derivada es la derivada de la primera derivada. Por lo tanto, los puntos de inflexión son los extremos relativos de la función derivada. Es decir:  $f''(x)=\frac{d(f'(x))}{dx}=0$ .*

*La recta tangente a una función en un extremo relativo es una recta horizontal, porque su pendiente es nula. La pendiente es el valor de la derivada de la función en el punto”.*