Colegio Marista "La Inmaculada" de Granada - Profesor Daniel Partal García - www.danipartal.net

Asignatura: Matemáticas II – 2ºBachillerato

Examen: Tema 2 Matemáticas II - Modelo 6 + Acumulado

página 1/2

## Instrucciones:

- a) Duración: 1 hora
- b) Tienes que **elegir** entre realizar únicamente los cuatro ejercicios de la **Opción A** o realizar únicamente los cuatro ejercicios de la **Opción B**. Indica, en la primera hoja donde resuelves el examen, la opción elegida.
- c) La puntuación de cada pregunta está indicada en la misma.
- **d)** Contesta de forma razonada y escribe a bolígrafo (no a lápiz) ordenadamente y con letra clara. Las faltas de ortografía, la mala presentación y no explicar adecuadamente las operaciones pueden restar hasta un máximo de 1 punto de la nota final.
- **e)** Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. No obstante, todos los procesos conducentes a la obtención de resultados deben estar suficientemente justificados.

## Opción A

**Ejercicio 1.- [2,5 puntos]** Determinar a y b para que la función sea continua en x=1 y su gráfica pase por el origen de coordenadas.

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - ax + b & si & x < 1 \\ \frac{\ln(x) - 1}{2x + 1 - e^{2x}} & si & x \ge 1 \end{cases}$$

**Ejercicio 2.- a) [1,5 puntos]** ¿Es cierto que la ecuación  $x^5-3x=1$  tiene al menos una solución en el intervalo  $\begin{bmatrix} 1,2 \end{bmatrix}$  ? Razona tu respuesta.

**b)** [1 puntos] La función  $f(x) = \frac{|x|}{x+1}$  tiene dos asíntotas horizontales distintas. Calcúlalas.

**Ejercicio 3.-** Sea  $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ 

- a) [2 puntos] Obtener todas sus asíntotas (ayuda: en las A.H. y en las A.O. debes estudiar comportamiento de x en  $+\infty$  y en  $-\infty$  ).
- **b)** [0,5 puntos] Estudia la posición relativa de la función respecto su asíntota oblicua cuando x tiende a  $+\infty$ .

**Ejercicio 4.- a) [1,5 puntos]** Estudia la continuidad de  $f(x)=2-|\ln(x)|$  y representa gráficamente la función

**b)** [1 punto] Sabiendo que  $\lim_{x\to 0} \frac{x-k\cdot sen(x)}{x^2}$  es finito, obtener el valor de k y el valor del límite.

Colegio Marista "La Inmaculada" de Granada - Profesor Daniel Partal García - www.danipartal.net

Asignatura: Matemáticas II – 2ºBachillerato

Examen: Tema 2 Matemáticas II - Modelo 6 + Acumulado

página 2/2

## Opción B

**Ejercicio 1.-** Sea 
$$f(x) = \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 2x + 3}$$

- a) [1,5 puntos] Obtener todas sus asíntotas.
- **b)** [1 punto] ¿Corta la función a su asíntota oblicua en algún punto? En caso afirmativo, obtener las coordenadas (x, y) del punto de corte.

**Ejercicio 2.- [2,5 puntos]** Considera las funciones f(x) y g(x) definidas en : $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$  y dadas por  $f(x) = 6x - x^2$  y  $g(x) = |x^2 - 2x|$ . Haz un boceto del recinto limitado por las gráficas de ambas funciones y calcula los puntos de corte de dichas gráficas (abscisas y su ordenada).

Ejercicio 3.- a) [1,5 puntos] Calcula 
$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(sen x)}{(\pi - 2x)^2}$$

**b) [1 punto]** La función f(x) = sen(x) con dominio en toda la recta real no admite inversa. Pero si la definimos en el dominio  $\left[\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  sí admite inversa. Explica estas dos afirmaciones de manera razonada.

Ejercicio 4.- a) [1,5 puntos] Calcula 
$$\lim_{x\to 0} (\cos(2x))^{\frac{3}{x^2}}$$

**b) [1 punto]** Determinar, de manera razonada, el dominio de  $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 4} - \ln(x)$